



West Virginia University Libraries




3 0802 101931998 1

RECEIVED

NOV 8 1956

WEST VIRGINIA UNIVERSITY
MEDICAL CENTER LIBRARY



Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
Lyrasis Members and Sloan Foundation

<http://www.archive.org/details/traitdanatomie00paul>

TRAITÉ
D'ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE

TOME DEUXIÈME

Locked
Cage
Qm
25
.P3
1869

Fig 2




Fig 1




PLANCHE I.

RÉGION SOUS-CLAVICULAIRE.

FIG. 4. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

A,B,C. Ligature de l'artère axillaire au-dessus du petit pectoral. — Procédé de Chamberlain. — Incision en L, dont la grande branche, horizontale, longe le bord inférieur de la clavicule et dont la branche verticale suit l'interstice des muscles grand pectoral et deltoïde.

D,E,F. Amputation dans l'articulation scapulo-humérale. — Procédé à un lambeau externe et supérieur (deltoïdien) de Dupuytren. — D,F, incision marquant la limite antérieure du lambeau. — E,F, section des parties molles du côté interne de l'aisselle.

G,H. Amputation dans l'articulation scapulo-humérale. — Procédé de Larrey. — Incision oblique antérieure partant de l'extrémité inférieure de l'incision verticale et aboutissant au bord antérieur de l'aisselle.

I,K,L,E. Résection dans l'articulation scapulo-humérale. — Procédé de B. Bell. — Incision verticale descendant de la face antérieure de l'acromion jusqu'à la rencontre d'une incision circulaire qui passe par les deux angles du creux de l'aisselle.

M,N. Résection de la tête de l'humérus. — Procédé de Baudens. — Incision verticale menée presque au-dessous de l'apophyse coracoïde.

O,P. Résection de la tête de l'humérus. — Procédé de Malgaigne. — Incision verticale dont l'extrémité supérieure correspond au sommet du triangle coraco-claviculaire.

FIG. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Faites, en suivant la face antérieure de la clavicule, une incision horizontale étendue du sommet de l'acromion au bord externe du faisceau claviculaire du grand pectoral. Une seconde incision partant de l'extrémité externe de la

première, descendra verticalement sur le moignon de l'épaule jusqu'au niveau de l'insertion humérale du deltoïde. Une troisième incision sera menée verticalement depuis l'extrémité interne de la première jusqu'au même niveau que la seconde, en passant par l'angle antérieur de l'aisselle. Enfin, vous complèterez le quadrilatère en joignant, sur la face antérieure du bras, l'extrémité inférieure des deux incisions verticales. Enlevez du premier coup la peau, la couche sous-cutanée et l'aponévrose qui recouvre les fibres musculaires, mais ayez soin de conserver les branches vasculaires et nerveuses qui se distribuent aux léguments. Vous trouverez les rameaux de l'artère acromio-thoracique à la partie supérieure de l'interstice compris entre le deltoïde et le grand pectoral. Plusieurs artérioles, émanées des circonflexes, irradient le deltoïde; mais elles n'ont point de position fixe. Quant aux nerfs, les branches sus-claviculaires et sus-acromiales du plexus cervical cheminent de haut en bas dans la même couche que les fibres inférieures du peaucier; les rameaux du circonflexe sont situés en bas et en dehors de la préparation. N'oubliez pas de conserver la veine céphalique, qui monte entre le grand pectoral et le deltoïde. Il sera bon de pousser, au préalable, une injection dans les veines du membre supérieur, surtout si vous voulez étudier le creux axillaire sur le même sujet.

EXPLICATION.

A.A. Coupe de la peau.	2, 2. Rameaux cutanés des artères circonflexes.
B. Clavicule.	3. Veine céphalique.
a. Faisceau claviculaire du grand pectoral.	4. Branche sus-claviculaire du plexus cervical.
b. Muscle deltoïde.	5, 5. Branches sus-acromiales du même plexus.
c. Portion de l'aponévrose brachiale qui recouvre le muscle biceps.	6, 6. Rameaux cutanés du nerf circonflexe.
t. Branche de l'artère acromio-thoracique.	7, 7. Branches du nerf brachial cutané interne.

PLANCHE 2.

RÉGIONS SOUS-CLAVICULAIRE ET SCAPULAIRE.

FIG. 1. — Région sous-claviculaire. — 3^e Plan.

Préparation. — Enlevez la veine céphalique. Coupez le deltoïde en suivant l'incision verticale externe de la peau, détachez-le de ses insertions à l'acromion et à la clavicule, rabattez de haut en bas le lambeau musculaire ainsi formé, et enlevez-le après l'avoir détaché de ses insertions à l'empreinte deltoïdienne de l'humérus. Vous aurez sous les yeux l'apophyse coracoïde, les muscles qui s'y insèrent, les ligaments qui l'unissent à la clavicule et à l'acromion, et la face antérieure de l'articulation scapulo-humérale; toutefois, pour mettre à nu la capsule fibreuse de cette dernière articulation, il sera nécessaire d'enlever une lame celluleuse qui la recouvre et qui se continue en haut avec le ligament acromio-claviculaire. Vous trouverez au-dessus du muscle petit pectoral une aponevrose qui remonte jusqu'à la clavicule et qui cache les branches du plexus brachial.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	
A, A.	Coupe de la peau.
B.	Coupe du deltoïde.
C.	Faisceau claviculaire du grand pectoral.
<i>Parties contenues dans le 3^e plan.</i>	
a.	Clavicule.
b.	Sommet de l'acromion.
c.	Apophyse coracoïde.
d.	Tête de l'humérus recouverte de la capsule orbiculaire.
e.	Corps de l'humérus.
f.	Ligament acromio-claviculaire.
g.	Ligament coraco-claviculaire antérieur (trapezoïde).
h.	Ligament coraco-claviculaire postérieur (conoïde ou rayonné).
i.	Ligament acromio-coracoïdien.
l.	Aponevrose clavi-pectorale coupée.
m.	Extrémité coracoïdienne du muscle petit pectoral.
n.	Extrémité externe du muscle sous-clavier.
o.	Muscle biceps brachial.
p.	Tendon de la longue portion du biceps.
q.	Courte portion du biceps et coraco-brachial réunis.
1.	Artère acromiale.
2.	Artère circumflexe postérieure.
3.	Branches du plexus brachial.
4.	Nerf circumflexe.

FIG. 2. — Région scapulaire. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

A, B, C. Amputation dans l'articulation scapulo-humérale : Face postérieure du lambeau deltoïdien de Dupuytren. — A, B, limite postérieure du lambeau. — B, G, section des parties molles du côté interne de l'aisselle.

H, E. Même opération. — Incision oblique postérieure du procédé de Larrey.

F, G, H, K. Même opération. — Procédé de B. Bell. — F, G, incision verticale postérieure. — H, K, face postérieure de l'incision circulaire.





PLANCHE 3.

RÉGION SCAPULAIRE.

Fig. 4. — 2^e Plan.

Préparation. — Faites à la peau une incision longeant le bord spinal de l'omoplate dans toute sa hauteur ; dirigez de l'angle inférieur du scapulum une incision horizontale étendue jusqu'au moignon de l'épaule et passant par l'angle postérieur de l'aisselle. Joignez directement l'extrémité supérieure de la première incision avec l'extrémité externe de la seconde, en suivant le sommet de l'épaule, le bec de l'acromion et la partie moyenne du deltoïde. Mettez à nu les fibres musculaires du trapèze et du deltoïde, en ayant soin de conserver les vaisseaux et les nerfs superficiels. Au delà du bord postérieur du deltoïde, vous laisserez en place l'aponévrose sous-épineuse qui recouvre les muscles sous-épineux, petit rond et grand rond. Enfin, vous préparerez une petite portion du grand dorsal qui cache l'angle inférieur de l'omoplate ; ici la dissection devra être conduite horizontalement.

EXPLICATION.

- | | |
|---|---|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
B. Épine de l'omoplate.
a. Muscle trapèze.
b. Muscle deltoïde.
c. Longue portion du triceps brachial.
d. Bord supérieur du grand dorsal.
e. Aponévrose sous-épineuse.
f. Fibres aponévrotiques du trapèze, qui renforcent l'aponévrose sous-épineuse.
g. Portion de cette aponévrose qui forme la gaine du petit rond.</p> | <p>h. Portion de cette aponévrose qui forme la gaine de grand rond.
1, 1. Branches de l'artère scapulaire supérieure.
2, 2. Branches de l'artère scapulaire postérieure.
3. Branche de l'artère scapulaire inférieure.
4, 4. Branches sus-acromiales du plexus cervical.
5, 5. Branches cutanées du nerf circonflexe.</p> |
|---|---|

Fig. 2. — 3^e Plan.

Préparation. — Détachez le trapèze et le deltoïde de leurs insertions à l'épine de l'omoplate ; renversez le premier de ces deux muscles de dehors en dedans, le second de dedans en dehors, et coupez-les sur les limites de la région, en suivant les incisions faites à la peau. Enlevez les aponévroses sus et sous-épineuses et préparez les muscles qui s'insèrent à l'omoplate. Cette préparation est très-facile.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- | | |
|--|--|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
B, B. Coupe du trapèze.
C. Coupe du deltoïde.
D. Acromion.
E. Épine de l'omoplate.
F. Bord spinal de l'omoplate.
G. Muscle angulaire.
H. Rhomboïde.
K. Grand dorsal.
L. Longue portion du triceps brachial.
M. Vaste externe.</p> | <p>Parties contenues dans le 3^e plan.
a. Tissu graisseux de la fosse sus-épineuse.
b. Muscle sus-épineux.
c. Muscle sous-épineux.
d. Muscle petit rond.
e. Muscle grand rond.
1, 1. Branches de l'artère scapulaire supérieure.
2. Branche de l'artère scapulaire inférieure.
3. Artère circonflexe postérieure.
4. Nerf circonflexe.</p> |
|--|--|

PLANCHE 4.

RÉGION SCAPULAIRE.

Fig. 4. — 4^e plan.

Préparation. — Coupez les muscles sus-épineux, sous-épineux et petit rond près de leurs insertions à l'humérus, et enlevez-les en conservant les vaisseaux et les nerfs qui rampent sous leur face profonde.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A, A. Coupe de la peau.
- B. Grand trochanter de l'humérus.
- C. Corps de l'humérus.
- D. Coupe du deltoïde.
- E. Coupe du trapèze.
- F. Muscle rhomboïde.
- G. Muscle angulaire.
- H. Muscle omo-hyoidien.
- K. Muscle grand rond.
- L. Longue portion du triceps brachial.
- M. Vaste externe.
- N. Coupe du sus-épineux.
- P. Coupe du sous-épineux.

Q. Coupe du petit rond.

Parties contenues dans le 4^e plan.

- a. Fosse sus-épineuse.
- b. Fosse sous-épineuse.
- c. Ligament coracoïdien.
- d. Épine de l'omoplate.
- e. Acromion.
- f. Bord spinal de l'omoplate.
- g. Bord axillaire.
- 1. Artère scapulaire supérieure.
- 2. Artère scapulaire inférieure.
- 3. Artère circumflexe postérieure.
- 4. Nef sus-scapulaire.
- 5. Nef circumflexe.

Fig. 2. — Plan profond (fosse sous-scapulaire).


Préparation. — Désarticulez la clavicule à son union avec le sternum, coupez les insertions costales du muscle sous-clavier, et enlevez complètement l'épaule en laissant adhérent à l'omoplate des lambeaux des muscles qui s'y insèrent. Renversez la pièce sur une table de façon à avoir sous les yeux la fosse sous-scapulaire; coupez

le tendon du grand pectoral près de son insertion à la corne bicipitale; enlevez toute la partie antérieure du deltoïde jusqu'à ce que vous ayez mis à découvert le petit trochanter de l'humérus. Découpez la face antérieure du sous-scapulaire en enlevant une portion des vaisseaux et des nerfs axillaires; du petit pectoral, du coraco-brachial et de la courte portion du biceps qui la cachent. Procédez ensuite à la dissection, et débarrassez-vous du tissu conjonctif et des ganglions lymphatiques qui recouvrent l'aponévrose sous-scapulaire. Après avoir étudié cette aponévrose, vous l'enlèverez pour voir le muscle sous-scapulaire en place. Cette préparation est un peu longue, mais elle permet de bien étudier la paroi postérieure du creux axillaire.


EXPLICATION.

- A, A. Coupe de la peau.
- B. Clavicule.
- C. Apophyse coracoïde.
- D. Ligament trapézoïde.
- E. Ligament coronoïde.
- F. Petit trochanter de l'humérus.
- a. Coupe du deltoïde.
- b. Muscle sous-clavier.
- c. Insertions du petit pectoral, de la courte portion du biceps brachial et du coraco-brachial à l'apophyse coracoïde.
- d. Tendon du grand pectoral.
- e. Tendon de la longue portion du biceps brachial.
- f. Extrémité inférieure de la courte portion du biceps et du coraco-brachial.

- g. Muscle grand dorsal.
- h. Muscle grand rond.
- k. Muscle sous-scapulaire.
- l. Muscle grand dentelé.
- m. Rhomboïde recouvert de son aponévrose profonde.
- 1, 1. Artère axillaire.
- 2. Artère scapulaire inférieure.
- 3. Artère circumflexe antérieure.
- 4, 4. Branches artérielles destinées au muscle sous-scapulaire.
- 5, 5. Veine axillaire.
- 6, 6. Nefs du plexus brachial.
- 7. Nef supérieur du sous-scapulaire.
- 8. Nef inférieur du même muscle.
- 9. Nef du grand rond.
- 10. Nef du grand dorsal.



150.



12

Fig 2




Fig 1




PLANCHE 5.

RÉGION DU MOIGNON DE L'ÉPAULE.

FIG. 1. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

A, B, C. Lambeau deltoïdien de Dupuytren, pour l'amputation dans l'articulation scapulo-humérale.

D, E, F. Amputation dans l'articulation scapulo-humérale. — 1^o Incision verticale de 3 à 4 centimètres de long, menée immédiatement au-dessous du bec de l'acromion ; 2^o deux incisions obliques allant passer par l'angle antérieur et par l'angle postérieur de l'aisselle.

G, H, K, L. Amputation dans l'articulation scapulo-humérale — Procédé de B. Bell. — G, H, incision circulaire. — K, L, incision verticale postérieure.

FIG. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Faire à la peau : 1^o une incision courbe et horizontale, suivant la clavicule, l'acromion et l'épine de l'omoplate dans toute l'étendue des insertions du

deltoïde ; 2^o deux incisions obliques partant des deux extrémités de la première et passant, l'une par l'angle antérieur, et l'autre par l'angle postérieur de l'aisselle ; 3^o joindre l'extrémité inférieure des deux incisions obliques par une incision horizontale menée au niveau de l'insertion humérale du deltoïde. Préparer d'abord l'aponévrose deltoïdienne pour en étudier la disposition, puis mettre le muscle à découvert, Conserver les vaisseaux et les nerfs superficiels.

EXPLICATION.

A, A.	Coupe de la peau.	2.	Branches de l'artère circonflexe postérieure.
B.	Extrémité externe de la clavicule.	3.	Veine céphalique.
C.	Sommet de l'acromion.	4.	Branches sus-claviculaire du plexus cervical.
a.	Muscle deltoïde.	5, 5.	Branches sus-acromiales du même plexus.
b.	Portion de l'aponévrose brachiale qui recouvre le muscle biceps.	6, 6.	Ramifications cutanées du nerf circonflexe.
c.	Portion de la même aponévrose qui recouvre le triceps.		
1.	Branches de l'artère acromio-thoracique.		

PLANCHE 6.

RÉGION DU MOIGNON DE L'ÉPAULE.

Fig. 1. — 3^e Plan.

Préparation. — Enlevez complètement le deltoïde; débarrassez les muscles sous-épineux, petit rond, biceps et triceps brachial de leur gaine aponeurotique, et disséquez la lame cellulo-fibreuse sous-deltôïdienne qui double la capsule orbiculaire de l'articulation scapulo-humérale.

EXPLICATION.


<i>Parties accessoires.</i>	
A.A. Coupe de la peau.	h. Courte portion du biceps brachial.
B. Coupe du trapèze.	k. Longue portion du même muscle.
C. Coupe du deltoïde.	l. Corps du biceps.
<i>Parties contenues dans le troisième plan.</i>	
a. Clavicule.	m. Grand pectoral.
b. Acromion.	n. Muscle sous-épineux
c. Apophyse coracoïde.	o. Muscle petit rond.
d. Ligament acromio-coracoïdien.	p. Muscle grand rond.
e. Membrane sous-deltôïdienne.	q. Longue portion du triceps brachial
f. Capsule orbiculaire de l'articulation scapulo-humérale.	r. Vaste externe.
g. Corps de l'humérus	1. Artère acromio-thoracique.
	2. Artère circonflexe postérieure.
	3. Artère circonflexe antérieure.
	4. Branche de l'artère humérale.
	5, 5. Nef circonflexe.

Préparation. — Sans rien changer à la préparation précédente, attirez l'humérus en bas autant qu'il vous sera possible, et enlevez toute la partie externe de la capsule articulaire.


Fig. 2. — 4^e Plan.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	
A.A. Coupe de la peau.	P. Vaste externe.
B. Clavicule.	Q. Artère acromio-thoracique.
C. Acromion.	R. Artère circonflexe postérieure.
D. Apophyse coracoïde.	S. Branche de l'artère humérale.
E. Ligament acromio-coracoïdien.	T. Nef circonflexe.
F. Corps de l'humérus.	
G. Coupe du trapèze.	
H. Coupe du deltoïde.	
I. Tendon de la courte portion du biceps brachial.	
K. Tendon de la longue portion du même muscle.	
L. Corps du biceps.	
M. Grand pectoral.	
N. Grand rond.	
O. Longue portion du triceps brachial.	
<hr/>	
<i>Parties contenues dans le quatrième plan.</i>	
a. Tête de l'humérus.	
b. Grand trochanter de l'humérus.	
c. Cavité glénoïde de l'omoplate.	
d, d. Capsule orbiculaire de l'articulation scapulo-humérale.	
e. Ligament coracoïdien.	
f. Portion intra-articulaire du tendon de la longue portion du biceps.	
g. Coupe du muscle sus-épineux.	
h. Coupe du sous-épineux.	
k. Muscle petit rond.	



30



三
五
一〇

PLANCHE 8.

RÉGION AXILLAIRE.

FIG. 1. — 3^e Plan.

Préparation. — Enlevez la partie moyenne du grand pectoral en conservant les vaisseaux et les nerfs thoraciques qui rampent sous la face profonde de ce muscle.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A,A. Coupe de la peau.
- B,B. Aponévrose du grand pectoral.
- C. Partie inférieure du ligament suspenseur de l'aisselle.
- D. Aponévrose du deltoïde.
- E. Aponévrose brachiale.
- F. Coupe du faisceau claviculaire du grand pectoral.
- G. Coupe du faisceau sternal du même muscle.

- H. Coupe du grand pectoral près de son insertion humérale.
- K,K. Branches sus-claviculaires du plexus cervical.

Parties contenues dans le troisième plan.

- a. Feuillet antérieur de la gaine aponévrotique du petit pectoral.
- 1,1. Branches de l'artère thoracique supérieure.
- 2. Veine céphalique.
- 3,3. Nerfs thoraciques du plexus brachial.

FIG. 2. — 4^e Plan.

Préparation. — Enlevez le mince feuillet aponévrotique qui passe en avant du petit pectoral, et préparez le ligament suspenseur de l'aisselle.



EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A,A. Coupe de la peau.
- B. Aponévrose du deltoïde.
- C. Aponévrose brachiale.
- D. Coupe du faisceau claviculaire du grand pectoral.
- E. Coupe du faisceau sternal du même muscle.
- F. Coupe du grand pectoral près de son insertion humérale.
- G. Branches sus-claviculaires du plexus brachial.

Parties contenues dans le quatrième plan.

- a. Feuillet antérieur de la gaine aponévrotique du petit pectoral.
- b. Muscle petit pectoral.
- c. Aponévrose clavi-pectorale.
- d. Ligament suspenseur de l'aisselle.
- 1,1. Branches de l'artère acromiale.
- 2. Branche de l'artère thoracique supérieure.
- 3. Veine céphalique.
- 4. Veine axillaire vue par transparence à travers l'aponévrose clavi-pectorale.
- 5. Nerf thoracique du plexus brachial.







PLANCHE 9.

RÉGION AXILLAIRE.

FIG. 1. — 5^e Plan.

Préparation. — Coupez le petit pectoral près de ses deux extrémités, enlevez-en la partie moyenne et débarrassez-vous de l'aponévrose qui cache les muscles profonds de la région. Vous aurez ensuite à disséquer les vaisseaux et les nerfs au milieu du tissu adipeux et des ganglions lymphatiques dont tout le creux axillaire est rempli. Cette préparation vous demandera beaucoup de temps et de patience. Il arrive très-fréquemment qu'après la section d'une veine, le sang dont elle est gorgée se répand sur la pièce et colore tous les tissus d'une teinte rouge qui gêne pour l'étude. Je ne connais pas de meilleur moyen, pour prévenir cet accident, que de pousser au préalable une bonne injection grasse dans les veines du membre supérieur. A défaut de cette injection, on évitera autant que possible d'ouvrir les troncs veineux, et si l'on est forcé de le faire, on aura soin de toujours les sectionner entre deux ligatures.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	
A,A. Coupe de la peau.	2. Artère acromio-thoracique.
B. Muscle deltoïde.	3. Artère thoracique supérieure.
C. Coupe du faisceau claviculaire du grand pectoral.	4. Artère thoracique longue ou mammaire externe.
D. Coupe du faisceau sternal du même muscle.	5. Veine axillaire.
E. Coupe du grand pectoral près de son insertion humérale.	6. Nerf musculo-cutané.
F,F. Coupes du petit pectoral.	7. Nerf médian.
G,G. Veine céphalique.	8. Nerf cubital.
	9. Nerf brachial cutané interne.
	10. Nerf accessoire du brachial cutané interne.
	11. Branche anastomotique entre le nerf brachial cutané interne et le deuxième nerf intercostal.
	12. Deuxième nerf intercostal.
	13. Troisième nerf intercostal.
	14. Nerf du grand dentelé (grand nerf respirateur externe de Ch. Bell).
	15. Branche thoracique du plexus brachial.
<i>Parties contenues dans le cinquième plan.</i>	
a,a. Faisceaux du muscle grand dentelé.	
b. Muscles grand dorsal et grand rond réunis.	
c. Muscle sous-scapulaire.	
d. Courte portion du biceps et coraco-brachial.	
1. Artère axillaire.	

FIG. 2.

Cette figure représente le même plan que la précédente. Elle est seulement destinée à montrer les rapports des différents organes de la région lorsque le bras est rapproché du tronc.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	
A,A. Coupe de la peau.	c,c. Faisceaux du grand dentelé.
B. Portion externe du muscle deltoïde.	d. Muscle grand dorsal.
C,C. Coupes de la portion antérieure du même muscle.	e. Tendon de la longue portion du biceps.
D. Coupe du faisceau claviculaire du grand pectoral.	f. Muscle sous-scapulaire.
E. Coupe du faisceau sternal du grand pectoral.	1. Artère axillaire.
F. Coupe du grand pectoral près de son insertion humérale.	2,2. Artère acromio-thoracique.
G. Coupe de l'extrémité inférieure du petit pectoral.	3. Artère thoracique supérieure.
H. Coupe de la courte portion du biceps brachial.	4. Artère thoracique longue ou mammaire externe.
K. Coupe du coraco-brachial.	5. Artère circonflexe antérieure.
L. Tendons du petit pectoral, de la courte portion du biceps et du coraco-brachial, réunis au niveau de l'apophyse coracoïde.	6. Veine axillaire.
M,M. Veine céphalique.	7. Nerf musculo-cutané.
	8. Nerf médian.
	9. Nerf cubital.
	10. Nerf brachial cutané interne.
	11. Nerf accessoire du brachial cutané interne.
	12. Deuxième nerf intercostal.
	13. Troisième nerf intercostal.
	14. Nerf du grand dentelé.
	15,15 Branches thoraciques du plexus brachial.
<i>Parties contenues dans ce plan.</i>	
a. Tête de l'humérus recouverte de la capsule orbiculaire.	
b,b. Muscles intercostaux externes.	

PLANCHE 10.

RÉGION BRACHIALE ANTÉRIEURE.

Fig. 1. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

Les incisions pour la ligature de l'artère humérale seront faites le long du bord interne du biceps, à une hauteur variable, selon qu'on voudra atteindre le vaisseau plus ou moins près de son origine. On aura soin d'éviter la veine basilique.

Les amputations dans la continuité se pratiquent, selon le cas, par les méthodes circulaire, ovulaire, elliptique, à un lambeau, à deux lambeaux (un antérieur et un postérieur, ou bien deux latéraux). Lorsqu'il n'y a pas de contre-indication, l'amputation circulaire est généralement préférée.

EXPLICATION.

- A. Saillie du deltoïde.
- B. Saillie du biceps.
- C. Saillie du long supinateur.
- D. Gouttière deltoïdienne antérieure.
- E. Gouttière humérale interne.
- F. Gouttière brachiale externe.
- G. Saillie de la veine basilique.

Fig. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Incisez la peau horizontalement sur les limites de la région, c'est-à-dire immédiatement au-dessous du tendon du grand pectoral et à un ou deux travers de doigt au-dessus des tubérosités épicondylienne et épitrachéenne. Joignez, sur la face antérieure du bras, ces deux incisions par une incision verticale médiane. Disséquez et rabattez de chaque côté du membre les deux lambeaux cutanés. Vous trouverez les vaisseaux et les nerfs superficiels dans l'épaisseur du fascia superficialis, et après les avoir isolés, vous mettrez à nu l'aponévrose d'enveloppe.

EXPLICATION.

- A, A. Coupe de la peau.
- B, B. Lambeau comprenant la peau et le pannicule adipeux sous-cutané.
- a. Aponévrose brachiale.
- 1. Veine céphalique.
- 2. Veine basilique.
- 3, 3. Veines superficielles secondaires de la face antérieure du bras.
- 4, 4. Rampeaux cutanés du nerf circonflexe.
- 5, 5. Rampeaux cutanés du nerf radial.
- 6. Rambeau du nerf accessoire du brachial cutané interne.
- 7. Rambeau supérieur du nerf brachial cutané interne.
- 8. Tronc du nerf brachial cutané interne.
- 9. Branche épitrachéenne du même nerf.
- 10, 10. Branches antérieures du même nerf.




Fig 2




Fig 1

Fig 2




Fig 1




PLANCHE 11.

RÉGION BRACHIALE ANTÉRIEURE.

Fig. 1. — 3^e Plan.

Préparation. — Enlevez l'aponévrose brachiale, les vaisseaux et les nerfs superficiels; la première conche musculaire se trouvera ainsi toute préparée.

EXPLICATION.

- | | |
|---|--|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
a. Extrémité inférieure du muscle deltoïde.
b. Muscle biceps brachial.
c. Portion externe du brachial antérieur.</p> | <p>d. Extrémité supérieure du long supinateur.
1. Petite branche deltoïdienne de l'artère humérale.
2, 2. Branches du nerf musculo-cutané.</p> |
|---|--|

Fig. 2. — 4^e Plan.

Préparation. — Coupez le biceps transversalement sur les limites de la région, et enlevez-en la partie moyenne en ménageant le nerf musculo-cutané qui longe sa face profonde. Enlevez de même l'extrémité inférieure du deltoïde. Il ne vous restera plus qu'à préparer avec soin les vaisseaux et les nerfs sans en altérer les rapports. Il n'est pas indispensable de conserver en place la veine basilique et le nerf brachial cutané interne, comme je l'ai fait.

EXPLICATION.

- | | |
|---|---|
| <p><i>Parties accessoires.</i>
A, A. Coupe de la peau.
B, B. Coupes du biceps.
C, C. Coupes du deltoïde.
D. Veine basilique.
E. Nerf brachial cutané interne.

<i>Parties contenues dans le quatrième plan.</i>
a. Corps de l'humérus.
b. Muscle coraco-brachial.
c. Muscle brachial antérieur.</p> | <p><i>d. Muscle long supinateur.</i>
1. Artère humérale.
2. Branche deltoïdienne de l'artère humérale.
3. Branche artérielle destinée au brachial antérieur.
4. Veine humérale externe.
5. Nerf musculo-cutané.
6. Nerf médian.
7. Branche anastomotique entre le nerf médian et le musculo-cutané.</p> |
|---|---|

PLANCHE 12.

RÉGION BRACHIALE POSTÉRIEURE.

FIG. 1. — 1^{er} Plan.

Voyez, pour la médecine opératoire, les indications données pl. 10, fig. 1.

EXPLICATION.

- | | |
|--|---|
| <i>a.</i> Sautie du deltoïde. | <i>d.</i> Dépression correspondant au tendon |
| <i>b.</i> Sautie de la portion interne du triceps
brachial. | inférieur du triceps. |
| <i>c.</i> Sautie de la portion externe du même
muscle. | <i>e.</i> Toulrière deltoïdienne postérieure. |

FIG. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Agissez identiquement comme vous l'avez fait pour préparer la région brachiale antérieure. La seule différence que je crois devoir indiquer, c'est que la peau est toujours notablement plus épaisse qu'en avant, tandis que l'aponévrose d'enveloppe est généralement plus mince. Cette dernière devient souvent très-délicate au niveau du tendon inférieur du triceps. Les veines superficielles, toutes de petit calibre, n'ont plus ici aucune importance. Bornez-vous à conserver les filets nerveux.

EXPLICATION.

- | | |
|--|---|
| <i>A, A.</i> Coupe de la peau. | <i>3, 3, 3.</i> Filets du rameau cutané de l'épaule |
| <i>B, B.</i> Lambeau comprenant la peau et le
panicule adipeux sous-cutané. | du nerf circonflexe. |
| <i>C.</i> Aponévrose brachiale. | <i>4.</i> Rameau du deuxième nerf inter-
costal. |
| <i>1, 1, 1.</i> Artérioles destinées à la peau. | <i>5, 5.</i> Rameaux du nerf brachial cutané |
| <i>2, 2, 2.</i> Veines superficielles de la face pos-
térieure du bras. | interne. |
| | <i>6.</i> Rameau du nerf radial. |





Fig 1



12.

Fig 2




Fig 1



PLANCHE 13.

RÉGION BRACHIALE POSTÉRIEURE.

FIG. 1. — 3^e Plan.

Préparation. — Enlevez les veines, les nerfs superficiels et l'aponévrose d'enveloppe. Suivez toujours, autant que possible, la direction des fibres musculaires sous-jacentes.

EXPLICATION.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A, A. Coupe de la peau. | c. Vaste externe. |
| a. Extrémité inférieure du deltoïde. | d. Longue portion du triceps. |
| b. Tendon inférieur du triceps. | 1, 1. Artérioles fourues par l'humérale. |

FIG. 2. — 4^e Plan.

Préparation. — Enlevez l'extrémité inférieure du deltoïde. Coupez, à leur partie supérieure, la longue portion et la portion externe du triceps; renversez-les de haut en bas et sectionnez-les transversalement sur la limite inférieure de la région. Vous apercevrez alors le vaste interne sur lequel vous aurez à préparer l'artère humérale profonde et le nerf radial. A la partie supérieure et interne de ce paquet vasculo-nerveux, vous trouverez le nerf cubital et vous pourrez l'étudier en rapport avec la veine basilique, si vous avez conservé cette dernière.

EXPLICATION.

- | <i>Parties accessoires.</i> | | <i>d. Petite portion du muscle brachial antérieur.</i> |
|---|--|---|
| A, A. Coupe de la peau. | | 1, 1. Artère humérale profonde ou collatérale externe. |
| B. Coupe de l'extrémité inférieure du triceps brachial. | | 2. Veine basilique. |
| C. Coupe de la longue portion du triceps. | | 3. Rameau cutané de l'épaule du nerf circonflexe. |
| D. Coupe du vaste externe. | | 4, 4. Nerf radial. |
| E. Coupe du deltoïde. | | 5, 5, 5. Rameaux perforants du nerf radial destinés à la peau de la partie externe du bras. |
| <i>Parties contenues dans le 4^e plan.</i> | | |
| a. Corps de l'humérus. | | 6, 6. Rameaux du même nerf destinés au vaste interne. |
| b. Portion interne ou vaste interne du triceps. | | 7. Nerf cubital. |
| c. Aponévrose intermusculaire externe. | | |

PLANCHE 14.

COUPES DU BRAS.

FIG. 1. — Coupe transversale au niveau de la partie inférieure de l'aisselle.

EXPLICATION.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| A, A. Coupe de la peau. | 1. Artère axillaire. |
| B. Extrémité supérieure de l'humérus. | 2. Artère circonflexe postérieure. |
| a. Muscle grand pectoral. | 3. Veine axillaire. |
| b, b. Muscle deltoïde. | 4. Veine céphalique. |
| c. Muscle triceps brachial. | 5. Veine superficielle postérieure. |
| d. Muscles grand dorsal et grand rond réunis. | 6, 6. Ganglions lymphatiques. |
| e. Muscle coraco-brachial. | 7. Nerf médian. |
| f. Courte portion du biceps brachial. | 8. Nerf cubital. |
| g. Tendon de la longue portion du biceps brachial. | 9. Nerf radial. |
| h. Muscle sous-scapulaire. | 10. Nerf brachial cutané interne. |

FIG. 2. — Coupe transversale immédiatement au-dessous du tendon du grand pectoral.

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| A, A. Coupe de la peau. | 2. Artère humérale profonde. |
| B. Corps de l'humérus. | 3, 3. Veines humérales. |
| a, a. Muscle deltoïde. | 4. Veine céphalique. |
| b. Longue portion du biceps. | 5. Veine superficielle postérieure. |
| c. Courte portion du biceps. | 6. Nerf médian. |
| d. Muscle coraco-brachial. | 7. Nerf radial. |
| e. Muscle triceps brachial. | 8. Nerf cubital. |
| 1. Artère humérale. | |

FIG. 3. — Coupe transversale à la partie moyenne du bras.

- | | |
|---|----------------------------------|
| A, A. Coupe de la peau. | 2. Artère humérale profonde. |
| B. Corps de l'humérus. | 3, 3. Veine humérale. |
| C. Aponévrose inter-musculaire interne. | 4. Veine basilique. |
| D. Aponévrose inter-musculaire externe. | 5. Veine céphalique. |
| a. Corps du biceps. | 6. Nerf médian. |
| b. Muscle brachial antérieur. | 7. Nerf cubital. |
| c, c. Muscle triceps brachial. | 8. Nerf brachial cutané interne. |
| 1. Artère humérale. | 9. Nerf radial. |

FIG. 4. — Coupe du bras à sa partie inférieure.

- | | |
|---|----------------------------------|
| A, A. Coupe de la peau. | 3, 3. Veines humérales. |
| B. Extrémité inférieure de l'humérus. | 4. Veine basilique. |
| a. Extrémité inférieure du biceps brachial. | 5. Veine céphalique. |
| b. Muscle brachial antérieur. | 6. Nerf médian. |
| c. Muscle long supinateur. | 7. Nerf cubital. |
| d, d. Muscle triceps brachial. | 8. Nerf radial. |
| 1. Artère humérale. | 9. Nerf brachial cutané interne. |
| 2. Artère humérale profonde. | 10. Nerf musculo-cutané. |

Fig 1




Fig. 3




Fig. 2





Fig 4.



Fig 2




Fig 1



PLANCHE 15.

RÉGION DU PLI DU COUDE.

FIG. 1. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

- A. — Ligature de l'artère humérale au pli du coude. — Incision de 5 à 6 centimètres sur le trajet d'une ligne allant du milieu de la région vers le bord interne du biceps et longeant la veine médiane basilique que l'on devra éviter.
- B, C, D. — Désarticulation du coude. — Procédé à un lambeau antérieur. — B, extrémité interne de l'incision commençant à 3 centimètres au-dessous de l'épitrôchlée. — C, extrémité externe, à 2 centimètres au-dessous de l'épitrôchlée. — D, sommet du lambeau descendant à 8 ou 10 centimètres de sa base.

FIG. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Faire à la peau deux incisions transversales embrassant la moitié antérieure de la circonférence du coude et situées à deux travers de doigt des tubérosités épicondylaires et épitrôchlées, l'une au-dessus, l'autre au-dessous de ces saillies osseuses. Réunir ces deux incisions par une incision longitudinale médiane, en ayant soin de ménager le fascia superficiel qui comprend, dans son épaisseur, les vaisseaux et les nerfs superficiels. Rabattre de chaque côté les deux lambeaux, en enlevant, avec la peau, le pannicule adipeux sous-cutané. Arrêter la dissection lorsqu'on aura dépassé l'épicondyle en dehors et l'épitrôchlée en dedans. Préparer les veines et les nerfs. Enfin mettre à nu l'aponévrose d'enveloppe par l'ablation du feuillet profond du fascia superficiel. L'injection préalable des veines n'est pas indispensable.

EXPLICATION.

A, A. Coupe de la peau.	3. Veine médiane commune.
B, B. Lambeau comprenant la peau et le pannicule adipeux sous-cutané.	4. Veine communicante allant de la médiane aux veines profondes.
a. Portion de l'aponévrose brachiale qui recouvre le muscle biceps.	5. Veine médiane céphalique.
b. Portion de la même aponévrose qui recouvre le long supinateur.	6. Veine médiane basilique.
c. Portion de la même aponévrose qui recouvre les muscles épitrôchléens.	7. Veine céphalique.
1, 1. Veines radiales.	8. Veine basilique.
2, 2. Veines cubitales.	9, 9. Rameaux du nerf radial.
	10, 10. Rameaux du nerf musculo-cutané.
	11, 11. Rameaux du nerf brachial cutané interne.

PLANCHE 16.

RÉGION DU PLI DU COUDE.

Fig. 1. — 3^e Plan.

Préparation. — Faites à l'aponévrose d'enveloppe, trois incisions identiques avec celles que vous avez pratiquées sur la peau pour la préparation du plan précédent. Rabattez les deux lambeaux en enlevant les vaisseaux et les nerfs superficiels. Ménagez l'expansion du biceps que vous poursuivrez jusque sur les muscles épitrochéens où vous devrez la délimiter artificiellement afin de découvrir le rond pronateur. Déponillez du tissu conjonctif qui les entoure, l'artère humérale, ses deux veines satellites, le nerf médian et l'artère collatérale interne; vous trouverez cette dernière sur l'aponévrose inter-musculaire interne, à une distance variable, au-dessus de l'épitrochlée. Découvrez la portion du muscle brachial antérieur visible en dehors du biceps, et coupez, au niveau du bord externe de ce dernier muscle, les branches du nerf musculo-cutané.

EXPLICATION.

A.A. Coupe de la peau.	1. Artère humérale.
a. Corps du biceps brachial.	2. Origine de l'artère radiale.
b. Tendon inférieur de ce muscle.	3. Artère collatérale interne.
c. Son expansion aponévrotique.	4, 4. Veines humérales.
d. Muscle brachial antérieur.	5. Veine communicante.
e. Aponévrose inter-musculaire interne.	6. Nerf médian.
f. Muscle long supinateur.	7, 7. Branches du nerf musculo-cutané.
g. Muscle rond pronateur.	

Fig. 2. — 4^e Plan.

Préparation. — Enlevez le corps du biceps et son expansion aponévrotique, de façon à ne conserver que le tendon inférieur de ce muscle. Enlevez de même; en dehors, le long supinateur, pour découvrir le premier radial externe; en dedans, toute la masse des muscles épitrochéens jusqu'au plan formé par le fléchisseur profond des doigts. Vous préparerez ensuite avec soin les nombreuses branches vasculaires et nerveuses qui occupent le milieu de la région.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	d. Muscle fléchisseur profond des doigts.
A.A. Coupe de la peau.	1. Artère humérale.
B.B. Coupe du biceps brachial.	2. Artère radiale.
C.C. Coupe du long supinateur.	3. Artère cubitale.
D.D. Coupe des muscles épitrochéens.	4. Artère collatérale interne.
<i>Parties contenues dans le 4^e plan.</i>	5. Artère récurrente radiale antérieure.
a. Muscle brachial antérieur.	6. Nerf musculo-cutané.
b. Aponévrose inter-musculaire interne.	7. Nerf médian.
c. Premier radial externe.	8. Nerf radial.
	9. Nerf cubital.

Fig. 1





Fig. 2







PLANCHE 17.

RÉGION DU PLI DU COUDE.

FIG. 1. — 5^e Plan.

Préparation. — Bornez-vous à mettre à découvert le muscle court supinateur, par l'ablation du long supinateur et des deux radiaux externes; vous préparerez en même temps la branche postérieure du nerf radial. Pour donner plus de netteté à la préparation et suivre plus aisément les branches artérielles, vous pourrez débarrasser celles-ci de leurs veines collatérales, ainsi qu'on le fait en anatomie descriptive.

EXPLICATION.

Parties accessoires.	
A, A. Coupe de la peau.	d. Muscle court supinateur.
B. Coupe du biceps brachial.	e. Muscle fléchisseur profond des doigts.
C. Extrémité supérieure du long supinateur.	f. Tendon inférieur du biceps brachial.
D. Extrémité supérieure du premier radial externe.	1. Artère humérale.
E. Extrémité supérieure du second radial externe.	2. Artère collatérale interne.
F. Muscle extenseur commun des doigts.	3. Artère radiale coupée à son origine.
G, G. Coupe des muscles superficiels de l'avant-bras.	4. Artère récurrente radiale antérieure.
H. Veines humérales.	5. Artère cubitale.
k. Nerf médian.	6. Tronc commun des artères récurrentes cubitales.
Parties contenues dans le 5 ^e plan.	
a. Épitrochlée.	7. Artère récurrente cubitale antérieure.
b. Aponevrose intermusculaire interne.	8. Artère récurrente cubitale postérieure.
c. Muscle brachial antérieur.	9. Tronc commun des interosseuses.
	10. Artère interosseuse antérieure.
	11. Artère interosseuse postérieure.
	12. Nerf cubital.
	13. Branche antérieure du nerf radial couée.
	14. Branche postérieure du nerf radial.
	15. Nerf musculo-rutane.

FIG. 2. — 6^e Plan.

Préparation. — Enlevez tous les muscles qui restent encore sur la face antérieure de l'articulation, en conservant seulement l'extrémité terminale du biceps et du brachial antérieur.

EXPLICATION.

Parties accessoires.		Parties contenues dans le 6 ^e plan.	
A. Coupe de la peau.	g. Corps de l'humérus.	a. Aponevrose intermusculaire interne.	t. Ligament huméro-coronoïdien.
B. Coupe du biceps brachial.	h. Épitrochlée.	b. Aponevrose intermusculaire externe.	u. Fibres antérieures du ligament latéral externe.
C. Coupe du brachial antérieur.	i. Bord interne de la trochlée humérale.	c. Insertions humérales du long supinateur et des deux radiaux externes.	v. Ligament annulaire.
D, D. Coupe des muscles de la face antérieure de l'avant-bras.	m. Saillie du condyle de l'humérus.	d. Tendon du muscle brachial antérieur.	1. 1. Branches de l'artère collatérale interne.
E. Coupe des vaisseaux huméraux.	n. Épicondyle.	e. Tendon inférieur du biceps brachial.	2. Branche antérieure de l'artère humérale profonde.
F. Coupe de l'artère radiale.	o. Corps du cubitus.	f. Muscle extenseur commun des doigts.	3. Branche de l'artère récurrente radiale antérieure.
G. Coupe de l'artère cubitale.	p. Corps du radius.		4. Artère récurrente cubitale antérieure.
H. Coupe de l'artère interosseuse antérieure.	q. Tubérosité bicipitale du radius.		
K. Coupe du nerf médian.	r. Col du radius.		
L. Coupe du nerf cubital.	s. Ligament antérieur de l'articulation du coude.		

PLANCHE 18.

RÉGION OLÉCRANIENNE.

Fig. 1. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

A, B. Résection du coude. — Procédé de Park. — Incision longitudinale médiane qu'on peut, au besoin, transformer en incision cruciale, pour se donner du jour.

C, D, E, F, G, H. Même opération. — Procédé de Moreau. — C, D, incision longitudinale le long du bord externe de l'humérus; le point C est situé à 5 ou 6 centimètres au-dessus de l'interligne articulaire. — E, F, incision longitudinale interne égale, en longueur, à la précédente. — G, H, incision transversale passant immédiatement au-dessus du sommet de l'olécrâne et aboutissant aux deux incisions longitudinales. — On obtient ainsi deux lambeaux quadrangulaires, un supérieur, E, G, H, G, et un inférieur, F, G, H, D.

C, D, G, H. Même opération. — Procédé de Roux. — C, D, incision longitudinale externe. — H, G, incision transversale. — C'est le procédé de Moreau, moins l'incision longitudinale interne. — Les deux lambeaux sont triangulaires, à base interne.

E, F, G, H. Même opération. — Procédé de Maisonneuve. — E, F, incision longitudinale interne. — G, H, incision transversale. — C'est le procédé de Moreau, moins l'incision longitudinale externe. — Deux lambeaux triangulaires à base externe.

C, K, L. Même opération. — Procédé de Nélaton. — C, K, incision longitudinale externe descendant jusqu'au niveau du col du Radius. — K, L, incision horizontale, perpendiculaire à l'extrémité inférieure de la précédente. — Un seul lambeau triangulaire à base supérieure et interne.

Fig. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Procédez identiquement comme vous l'avez fait à la région du pli du coude, en prenant un peu plus de précaution pour ménager les vaisseaux et les nerfs superficiels, car le fascia sous-cutané n'est pas toujours très-distinct. Au reste, les veines n'ont qu'une médiocre importance, et vous pouvez vous borner à conserver les rameaux nerveux.

EXPLICATION.

A, A. Coupe de la peau.	1, 1. Petites artères téguementenses four-
B, B. Lambeaux comprenant la peau et le pannicule adipeux sous-cutané.	nies par les veines.
a. Portion de l'apophérose d'enveloppe qui recouvre le muscle triceps.	2, 2, 2. Veines superficielles nommées de la région olécrânienne.
b. Portion de l'apophérose qui recouvre les muscles épicondyléens.	3, 3. Rameaux cutanés du nerf radial.
c. Portion de l'apophérose qui recouvre le muscle cubital antérieur.	4. Branche du nerf musculo-cutané.
	5. Branche épithochléenne du nerf brachial cutané interne.
	6. Rameaux du nerf brachial cutané interne.




Fig 1




Fig 2

Fig 1





Fig 2



PLANCIE 19.

RÉGION OLÉCRANIENNE.

FIG. 4. — 3^e Plan.

Préparation. — Enlevez l'aponévrose qui recouvre le muscle triceps brachial; mettez à découvert le muscle anconé et le nerf cubital à son passage entre l'épitrachée et l'olécrâne. Cette préparation ne présente aucune difficulté.

EXPLICATION.

- | | |
|---|---|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
B. Olécrâne.
C. Épicondyle.
D. Épitrachée.
a. Portion moyenne du triceps brachial.
b. Vaste interne.
c. Vaste externe.
d. Anconé.
e. Cubital postérieur.</p> | <p>f. Insertion épitrachéenne du cubital antérieur.
g. Insertion olécraniennne du même muscle.
1. 1. Branches de l'artère récurrente radiale postérieure.
2, 2. Branches de l'artère récurrente cubitale postérieure.
3. Artère collatérale du nerf cubital.
4. Nerf cubital.</p> |
|---|---|

FIG. 2. — 4^e Plan.

Préparation. — Coupez transversalement le triceps sur la limite supérieure de la région. Renversez-le de haut en bas, en le délaçant des aponévroses intermusculaires, et sectionnez-le à la hauteur du bord supérieur de l'olécrâne. Enlevez de même les muscles anconé, cubital antérieur, cubital postérieur et le nerf cubital, en ayant soin de ménager les vaisseaux qui rampent sur la face postérieure de l'articulation. Il ne vous restera plus qu'à extraire le tissu conjonctif qui recouvre les ligaments.

EXPLICATION.


- | | |
|--|--|
| <p><i>Parties accessoires.</i>
A, A. Coupe de la peau.
B. Coupe supérieure du triceps brachial.
C. Coupe du tendon inférieur du triceps.
D. Coupe du cubital antérieur.
E. Coupe du cubital postérieur.</p> <p><i>Parties contenues dans le 4^e plan.</i>
a. Aponévrose intermusculaire interne.
b. Aponévrose intermusculaire externe.
c. Face profonde du muscle grand palmaire.
d. Face profonde du muscle extenseur commun des doigts.
e. Muscle court supinateur.</p> | <p>f. Corps de l'humérus.
g. Épitrachée.
h. Épicondyle.
k. Corps du cubitus.
l. Olécrâne.
m. Col du radius.
n. Ligament latéral interne.
o. Ligament transverse ou épitrachéo-olécrânien.
p. Ligament latéral externe.
q. Ligament annulaire.
1. Branche postérieure de l'artère collatérale interne.
2. Branche postérieure de l'artère humérale profonde.
3. Artère récurrente cubitale postérieure.
4. Artère récurrente radiale postérieure.</p> |
|--|--|

PLANCHE 20.

RÉGION ANTIBRACHIALE ANTÉRIEURE.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

- A. Ligature de l'artère radiale au tiers inférieur de l'avant-bras. — Incision de 4 ou 5 centimètres le long de l'interstice qui sépare les tendons du grand palmaire et du long supinateur.
- B. Ligature de l'artère radiale au tiers supérieur de l'avant-bras. — Incision de 6 ou 7 centimètres, suivant la saillie du bord interne du muscle long supinateur. — A défaut de cette saillie, l'incision suivrait le trajet d'une ligne dont l'extrémité supérieure serait située à 13 millimètres en dehors du milieu du pli du coude, et dont l'extrémité inférieure irait tomber à égale distance entre l'apophyse styloïde du radius et le tendon du grand palmaire.
- C. Ligature de l'artère cubitale au tiers inférieur de l'avant-bras. — Incision de 5 à 6 centimètres, le long du bord radial du muscle cubital antérieur.
- D. Ligature de l'artère cubitale à la partie moyenne de l'avant-bras. — Incision de 7 ou 8 centimètres suivant le bord radial du muscle cubital antérieur. — Si la saillie de ce muscle n'était pas visible, on inciserait la peau dans la direction présumée de l'artère, puis on chercherait, pour inciser l'aponévrose, le premier interstice musculaire, en partant du bord interne du cubitus et en marchant vers le radius.
- E. Ligature de l'artère cubitale au tiers supérieur de l'avant-bras. — On lie le vaisseau à l'union du tiers supérieur avec le tiers moyen de l'avant-bras. Sa direction est indiquée par le trajet d'une ligne allant de l'épitrachée au côté externe du pisiforme. — Plus haut, la ligature est regardée comme impossible ou peu praticable.
- Les amputations de l'avant-bras peuvent se faire à toutes les hauteurs et par toutes les méthodes. — A moins de contre-indication, on préfère généralement la méthode circulaire.






PLANCHE 21.

RÉGION ANTIBRACHIALE ANTÉRIEURE.

2^e Plan.

Préparation. — Faites deux incisions horizontales : la première à la hauteur de l'épitrachlée ou un peu au dessous, la seconde au niveau du premier pli que vous rencontrerez sur la face antérieure de l'avant-bras, en avançant vers le poignet. Menez ensuite une incision verticale médiane étendue d'un bout à l'autre de la région. Enlevez du même coup la peau et le pannicule adipeux, en rabattant les deux lambeaux de chaque côté du membre. Préparez ensuite les vaisseaux et les nerfs superficiels, entre les deux feuillets du fascia superficialis. Enfin, découvrez l'aponévrose d'enveloppe.

EXPLICATION.

- | | |
|---|--|
| A,A. Coupe de la peau. | 5. Veine médiane céphalique. |
| B,B. Lambeau comprenant la peau et le pannicule adipeux sous-cutané. | 6. Veine médiane basilique. |
| a,a. Aponévrose antibrachiale. | 7. Veine communicante. |
| 1. Artère radiale et ses deux veines satellites vues par transparence à travers l'aponévrose. | 8,8. Rameaux veineux de la face antérieure de l'avant-bras. |
| 2,2. Veines radiales. | 9,9. Rameaux du nerf musculo-cutané. |
| 3,3. Veines cubitales. | 10. Rameau perforant du nerf radial. |
| 4,4. Veine médiane commune. | 11,11. Rameaux de la branche antérieure du nerf brachial cutané interne. |
| | 12. Rameau palmaire cutané du nerf médian. |

PLANCHE 22.

RÉGION ANTIBRACHIALE ANTÉRIEURE.

3^e Plan.

Préparation. — Il vous suffira, pour préparer ce plan, d'enlever l'aponévrose antibrachiale.

EXPLICATION.

A, A. Coupe de la peau.
B. Epitrochlée.
C. Expansion aponévrotique du biceps brachial.
a. Muscle long supinateur.
b. Tendon du long abducteur du pouce.
c. Muscle rond pronateur.

d. Muscle grand palmaire.
e. Muscle petit palmaire.
f. Muscle cubital antérieur.
g, g. Tendons du fléchisseur sublime.
1. Artère radiale.






PLANCHE 23.

RÉGION ANTIBRACHIALE ANTÉRIEURE.

4^e Plan.

Préparation. — Coupez, près de la limite inférieure de la région, les tendons du grand palmaire, du petit palmaire et du cubital antérieur. Rabattez ces muscles de bas en haut, et coupez-en les corps charnus un peu au-dessous de l'insertion épitrochléenne, en ayant soin de ménager le rond pronateur. Enlevez ensuite une lamelle aponévrotique qui recouvre le fléchisseur sublime; puis, après avoir étudié ce dernier muscle en place, vous l'enlèverez en procédant de la même façon que pour les trois précédents. Il ne vous restera plus qu'à nettoyer un plan constitué par les deux muscles fléchisseur profond des doigts et long fléchisseur propre du pouce. Dans ce plan se trouvent contenus les principaux nerfs de l'avant-bras, ainsi que les artères radiale et cubitale.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A, A. Coupe de la peau.
- B. Épitrochlée.
- C. Coupe des muscles épitrochléens.
- D. Expansion aponévrotique du biceps.
- E. Muscle long supinateur.
- F. Muscle long abducteur du pouce.
- G. Aponévrose antibrachiale.
- H. Tendon du grand palmaire.
- K. Tendon du petit palmaire.
- L, L. Tendons du fléchisseur sublime.
- M. Tendon du cubital antérieur.
- N. Artère humérale au pli du bras.

- O. Nerf médian au pli du bras.

Parties contenues dans le quatrième plan.

- a. Faisceau épitrochléen du muscle rond pronateur.
- b. Faisceau coronoïdien du même muscle.
- c, c. Muscle fléchisseur profond des doigts.
- d. Muscle long fléchisseur propre du pouce.
- 1. Artère radiale.
- 2. Artère cubitale.
- 3. Nerf médian à l'avant-bras.
- 4. Rameau palmaire cutané du nerf médian.
- 5. Nerf cubital.
- 6. Rameau cutané du nerf cubital.

PLANCHE 24.

RÉGION ANTIBRACHIALE ANTÉRIEURE.

5^e Plan.

Préparation. — Enlevez la partie inférieure du muscle rond pronateur, le nerf médian, le nerf cubital, l'artère radiale, l'artère cubitale, le long supinateur, le long fléchisseur du pouce et le fléchisseur commun des doigts. En conservant les extrémités de ces organes, comme le représente la figure, vous aurez une préparation d'ensemble qui vous permettra de revoir, d'un seul coup d'œil, les différents plans de la région. N'oubliez pas de ménager la branche antérieure du nerf radial qui passe obliquement sous la face profonde du muscle long supinateur. Vous terminerez la préparation en détachant le tissu conjonctif qui recouvre les muscles radiaux, le carré pronateur, les vaisseaux et le nerf interosseux.

EXPLICATION.


Parties accessoires.

- A, A. Coupe de la peau.
- B. Tendon inférieur du biceps brachial.
- C. Expansion aponévrotique du biceps.
- D. Épitrochlée.
- E. Masse commune des muscles épitrochléens.
- F. Extrémité supérieure du long supinateur.
- G. Extrémité supérieure du fléchisseur profond des doigts.
- H. Extrémité supérieure du long fléchisseur du pouce.
- I. Tendon du cubital antérieur.
- J. Tendon du petit palmaire.
- K. Tendon du grand palmaire.
- L. Tendons du fléchisseur sublime.
- M. Tendons du fléchisseur profond des doigts.
- N. Tendon du long supinateur.
- O. Muscle long abducteur du pouce.
- P. Muscle court extenseur du pouce.
- Q. Artère humérale au pli du bras.
- R. Extrémité supérieure de l'artère radiale.
- S. Extrémité supérieure de l'artère cubitale.

- T. Artère récurrente cubitale antérieure.
- U. Extrémité inférieure de l'artère radiale.
- V. Artère radio-palmaire.
- W. Extrémité inférieure de l'artère cubitale.
- X. Nerf médian au pli du coude.
- Y. Nerf médian à l'avant-bras.
- Z. Nerf cubital.

Parties contenues dans le cinquième plan.

- a. Radius.
- b. Cubitus.
- c. Ligament interosseux.
- d. Muscle premier radial externe.
- e. Muscle second radial externe.
- f. Muscle court supinateur.
- g. Extrémité inférieure du rond pronateur.
- h. Muscle carré pronateur.
- 1. Artère interosseuse antérieure.
- 2. Nerf interosseux.
- 3. Branche antérieure du nerf radial.






PLANCHE 25.

RÉGION ANTIBRACHIALE POSTÉRIEURE.

1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

- A,B. Amputation dans l'articulation radio-carpienne. — Méthode circulaire. — Incision circulaire au niveau des extrémités carpiennes du premier et du cinquième métacarpien, c'est-à-dire en rasant la racine des éminences thénar et hypothénar.
- C,D. Amputation dans l'articulation du coude. — Méthode circulaire. — Procédé de Cornuau. — Incision circulaire à trois travers de doigt au-dessous de l'interligne articulaire, ou mieux à quatre ou cinq travers de doigt au-dessous de l'épitrachée dont il est toujours facile de sentir la saillie.

Pour ce qui est relatif aux amputations de l'avant-bras dans la continuité, voyez l'explication de la pl. 20.

PLANCHE 26.

RÉGION ANTIBRACHIALE POSTÉRIEURE.

2^e Plan.

Préparation. — Délimitez la région par deux incisions horizontales menées à la même hauteur que celles de la région antibrachiale antérieure. Enlevez la peau et le pannicule adipeux sous-cutané, préparez les veines et les nerfs superficiels, et mettez à découvert l'aponévrose antibrachiale par l'ablation du fascia superficialis.

EXPLICATION.

A,A. Coupe de la peau.	1,1. Artérioles destinées à la peau.
B,B. Lambeau comprenant la peau et le pannicule adipeux sous-cutané.	2,2. Veines innommées de la face postérieure de l'avant-bras.
C. Bourse séreuse rétro-olécrânienne ouverte.	3,3. Veines radiales.
D. Saillie de l'épicondyle.	4,4. Rameaux du nerf brachial cutané interne.
E,E. Aponévrose antibrachiale.	5. Rameau cutané du nerf cubital.
F. Portion de cette aponévrose qui constitue le ligament annulaire postérieur du carpe.	6,6. Branches du nerf musculo-cutané.
	7. Rameau cutané dorsal du nerf radial.








PLANCHE 27.

RÉGION ANTIBRACHIALE POSTÉRIEURE.

3^e Plan.

Préparation. — Conservez seulement la portion de l'aponévrose antibrachiale qui forme le ligament annulaire postérieur du carpe et enlevez tout le reste de cette aponévrose avec les vaisseaux et les nerfs superficiels. Vous éviterez autant que possible de déchirer la partie supérieure des muscles extenseurs et l'anconé auxquels l'aponévrose est extrêmement adhérente.

EXPLICATION.

- A, A. Coupe de la peau.
- B. Ligament annulaire postérieur du carpe.
- C. Épicondyle.
- D. Olécrâne.
- a. Muscle anconé.
- b. Muscle cubital postérieur.
- c. Muscle extenseur propre du petit doigt.
- d. Muscle extenseur commun des doigts.
- e. Muscle long supinateur.

- f, f. Muscle premier radial externe.
- g, g. Muscle second radial externe.
- h. Muscle long abducteur du pouce.
- k. Muscle court extenseur du pouce.
- l. Muscle long extenseur du pouce.
- m. Portion de l'extenseur propre de l'index.
- 1, 1. Rameaux de l'artère interosseuse postérieure.
- 2. Rameau de l'artère humérale profonde.

PLANCHE 28.

RÉGION ANTIBRACHIALE POSTÉRIEURE.

4^e Plan.

Préparation. — Coupez le tendon de l'extenseur commun, de l'extenseur propre du petit doigt et du cubital postérieur immédiatement au-dessus du ligament annulaire postérieur. Renversez ces muscles de bas en haut et sectionnez-les transversalement lorsque vous aurez mis à découvert le court supinateur. Il ne vous restera plus qu'à enlever une lame celluleuse qui recouvre le plan profond et à débarrasser ce plan du tissu conjonctif qui la cache en partie.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A,A. Coupe de la peau.
- B. Épicondyle.
- C. Olécrâne.
- D. Extrémité supérieure de l'extenseur commun des doigts.
- E. Extrémité supérieure du cubital postérieur.
- F. Muscle anconé.
- G. Ligament annulaire postérieur du carpe.
- H,H. Tendons de l'extenseur commun des doigts.
- K. Tendon de l'extenseur propre du petit doigt.
- L. Tendon du cubital postérieur.
- M. Muscle long supinateur.

- N,N. Premier radial externe.
- O,O. Second radial externe.

Parties contenues dans le quatrième plan.

- a. Face postérieure du radius.
- b. Face postérieure du cubitus.
- c. Muscle court supinateur.
- d. Long abducteur propre du pouce.
- e. Muscle court extenseur propre du pouce.
- f. Muscle long extenseur du pouce.
- g. Extenseur propre de l'index.
- 1. Artère interosseuse postérieure.
- 2,2. Rameaux de la branche postérieure du nerf radial.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 1




Fig. 2



PLANCHE 29.

COUPES DE L'AVANT-BRAS.

FIG. 1. — Coupe transversale de l'avant-bras sur la limite du coude.

EXPLICATION.

- | | |
|--|--|
| <p>A. Coupe du cubitus.
 B. Coupe du radius.
 a. Coupe des muscles épitrochléens (extrémité supérieure du rond pronateur, du grand et du petit palmaires).
 b. Muscle cubital antérieur.
 c. Muscle fléchisseur sublime.
 d. Muscle fléchisseur profond des doigts.
 e. Muscle anconé.
 f. Muscle long supinateur.
 g. Premier radial externe.
 h. Second radial externe.
 k. Muscle court supinateur.
 l. Tendon du biceps brachial.
 m. Coupe des muscles épicondyliens.</p> | <p>1. Artère radiale.
 2. Artère cubitale.
 3. Artère interosseuse antérieure.
 4. Artère récurrente radiale antérieure.
 5. Artère récurrente cubitale antérieure.
 6. Veine médiane commune.
 7, 7. Veines radiales superficielles.
 8, 8. Veines cubitales superficielles.
 9. Nerf médian.
 10. Nerf radial.
 11. Nerf cubital.
 12. Rameau du nerf musculo-cutané.
 13. Rameau du nerf brachial cutané interne.</p> |
|--|--|

FIG. 2. — Coupe transversale au tiers supérieur de l'avant-bras.

EXPLICATION.

- | | |
|--|--|
| <p>A. Coupe du cubitus.
 B. Coupe du radius.
 a. Tendon du petit palmaire.
 b. Muscle grand palmaire.
 c. Muscle rond pronateur.
 d. Muscle fléchisseur sublime.
 e. Muscle cubital antérieur.
 f. Muscle fléchisseur profond des doigts.
 g. Muscle long fléchisseur du pouce.
 h. Muscle extenseur commun des doigts.
 k. Muscle extenseur propre du petit doigt.
 l. Muscle cubital postérieur.
 m. Muscle long abducteur du pouce.
 n. Muscle long supinateur.</p> | <p>o. Premier radial externe.
 p. Second radial externe.
 q. Muscle court supinateur.
 1. Artère radiale.
 2. Artère cubitale.
 3. Artère interosseuse antérieure.
 4. Veines radiales superficielles.
 5. Veines cubitales superficielles.
 6. Nerf médian.
 7. Nerf radial.
 8. Nerf cubital.
 9. Nerf interosseux.
 10. Rameau du nerf musculo-cutané.
 11. Rameau du nerf brachial cutané interne.</p> |
|--|--|

FIG. 3. — Coupe transversale au tiers moyen de l'avant-bras.

EXPLICATION.

- | | |
|---|--|
| <p>A. Coupe du cubitus.
 B. Coupe du radius.
 a. Tendon du petit palmaire.
 b. Tendon du grand palmaire.
 c. Muscle cubital antérieur.
 d. Muscle fléchisseur sublime.
 e. Muscle fléchisseur profond des doigts.
 f. Muscle long fléchisseur du pouce.
 g. Muscle extenseur commun des doigts.
 h. Muscle extenseur propre du petit doigt.
 k. Muscle cubital postérieur.
 l. Muscle long abducteur du pouce.
 m. Muscle court extenseur du pouce.</p> | <p>n. Tendon du long supinateur.
 o. Tendon du premier radial externe.
 p. Tendon du second radial externe.
 1. Artère radiale.
 2. Artère cubitale.
 3. Artère interosseuse antérieure.
 4. Branche de l'artère interosseuse postérieure.
 5, 5. Veines superficielles de l'avant-bras.
 6. Nerf médian.
 7. Nerf radial (branche cutanée).
 8. Nerf cubital.
 9. Rameau du nerf musculo-cutané.
 10. Rameau du nerf brachial cutané interne.</p> |
|---|--|

FIG. 4. — Coupe transversale au tiers inférieur de l'avant-bras.

EXPLICATION.

- | | |
|--|--|
| <p>A. Coupe du cubitus.
 B. Coupe du radius.
 a. Tendon du petit palmaire.
 b. Tendon du grand palmaire.
 c. Muscle cubital antérieur.
 d. Muscle fléchisseur sublime.
 e. Tendon du long fléchisseur du pouce.
 f. Muscle carré pronateur.
 g. Muscles extenseurs des doigts.
 h. Tendon du cubital postérieur.
 k. Muscle long extenseur du pouce.
 l. Muscle extenseur propre de l'index.</p> | <p>m. Tendon du long supinateur.
 n. Tendon du premier radial externe.
 o. Tendon du second radial externe.
 p. Tendons réunis du long abducteur et du court extenseur du pouce.
 1. Artère radiale.
 2. Artère cubitale.
 3. Artère interosseuse antérieure.
 4. Branche de l'artère interosseuse postérieure.
 5, 5. Veines superficielles de l'avant-bras.
 6. Nerf médian.
 7. Nerf cubital.</p> |
|--|--|

PLANCHE 30.

RÉGION PALMAIRE.

Fig. 1. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

- A, B. Amputation dans l'articulation radio-carpienne. — Procédé à lambeau palmaire. — Les deux extrémités du lambeau aboutissent à 6 ou 7 millimètres au-dessous des apophyses styloïdes du cubitus et du radius.
- C, D. Désarticulation du premier métacarpien. — Méthode ovale. — Incision en raquette. — L'incision ovale va rejoindre l'incision verticale à 25 ou 30 millimètres au-dessous de l'artic (voy. pl. 33, fig. 1).
- E, F. Désarticulation des quatre derniers doigts. — Méthode elliptique. — L'incision palmaire doit descendre aussi bas que possible sur la racine des doigts.
- G, H. Amputation de la seconde phalange d'un doigt. — Procédé à lambeau palmaire. — La base du lambeau correspond au pli digital palmaire.
- K, L. Amputation de la troisième phalange d'un doigt. — Procédé à lambeau palmaire. — La base du lambeau correspond à 2 millimètres au-dessous du pli digital palmaire.

Fig. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Incisez transversalement la peau : 1^o sur le pli qui marque la limite entre l'avant-bras et le poignet ; 2^o en suivant la racine des doigts. Joignez ces deux incisions par une incision verticale médiane et rabattez de chaque côté les lambeaux cutanés en mettant à découvert les trois portions de l'aponévrose palmaire. Vous conserverez les vaisseaux et les nerfs qui se distribuent à la peau, et vous aurez soin de ménager le muscle palmaire cutané dont les faisceaux, immédiatement sous-dermiques, s'étendent transversalement sur la racine de l'éminence hypothénar. Les

languettes que l'aponévrose palmaire moyenne envoie aux commissures interdigitales seront coupées après que vous en aurez étudié la disposition. Enfin, vous incisez longitudinalement la lace palmaire d'un doigt et vous préparerez la gaine des tendons fléchisseurs.

EXPLICATION.

A, A.	Coupe de la peau.	3.	Veines superficielles de l'éminence thénar.
B, B.	Lambeaux cutanés.	4.	Veines superficielles de l'éminence hypothénar.
a.	Aponévrose antibrachiale.	5.	Nerf collatéral externe dorsal du ponce, fourni par le radial.
b.	Tendon du muscle cubital antérieur.	6, 6.	Nerfs collatéraux palmaires du ponce, fournis par le médian.
c.	Tendon du muscle petit palmaire.	7.	Rameau cutané palmaire du nerf médian.
d.	Aponévrose palmaire moyenne.	8, 8.	Autres rameaux cutanés fournis par le même nerf.
e, e.	Languettes que l'aponévrose palmaire moyenne envoie à la peau de la racine des doigts.	9.	Nerf collatéral palmaire externe de l'index.
f, f.	Fibres transversales et arcades de l'aponévrose palmaire moyenne.	10.	Nerf collatéral palmaire interne de l'index.
g.	Origine des gâtes des tendons fléchisseurs.	11, 11.	Nerfs collatéraux palmaires du médian.
h.	Gaine des tendons fléchisseurs du médian.	12.	Nerf collatéral externe de l'annulaire, fourni par le médian.
k, k.	Fibres en X qui constituent cette gaine au devant des articulations phalangiennes.	13.	Nerf collatéral palmaire interne de l'annulaire, fourni par le cubital.
l.	Aponévrose qui recouvre l'éminence thénar.	14, 14.	Nerfs collatéraux palmaires du petit doigt.
m.	Muscle palmaire cutané.	15, 15.	Rameaux cutanés palmaires du nerf cubital.
n.	Aponévrose de l'éminence hypothénar.		
1.	Artérioles fournies par l'arcade palmaire superficielle.		
2, 2.	Artères collatérales des doigts.		




Fig 1




Fig 2

Fig. 2.




Fig. 1.




PLANCHE 31.

RÉGION PALMAIRE.

Fig. 1. — 3^e Plan.

Préparation. — Enlevez l'aponévrose antibrachiale. Coupez transversalement le tendon du petit palmaire et renversez de haut en bas l'aponévrose palmaire moyenne, en la détachant du ligament annulaire antérieur du carpe et en coupant les cloisons qui l'unissent à l'aponévrose interosseuse. Mettez à nu les muscles des éminences thénar et hypothénar et enlevez le tissu conjonctif qui entoure tous les organes de la région palmaire. Vous terminerez en ouvrant longitudinalement la gaine palmaire d'un doigt pour voir la disposition des tendons fléchisseurs.

EXPLICATION.

A, A.	Coupe de la peau.	n, n.	Tendons du fléchisseur sublime à la main.
B.	Ligament annulaire antérieur du carpe.	o, o.	Tendons du fléchisseur profond à la main.
a.	Tendon du muscle court extenseur du pouce.	p, p.	Muscles lombrireaux.
b.	Tendon du muscle long abducteur du pouce.	q.	Muscle adducteur du petit doigt.
c.	Tendon du muscle grand palmaire.	r.	Muscle court fléchisseur du petit doigt.
d, d.	Muscle fléchisseur sublime au poignet.	1.	Artère radiale.
e.	Extrémité inférieure du cubital antérieur.	2.	Artère radio-palmaire.
f.	Faisceau supérieur du court abducteur du pouce.	3.	Artère cubitale.
g.	Faisceau inférieur du même muscle.	4.	Artère cubitale.
h.	Faisceau superficiel du court fléchisseur du pouce.	5.	Artères collatérales des doigts fournies par la convexité de l'arcade palmaire superficielle.
k.	Tendon du muscle long fléchisseur du pouce.	6.	Nerf cubital.
l.	Muscle court adducteur du pouce.	7, 7.	Nerfs collatéraux palmaires fournis par le médian.
m.	Premier interosseux dorsal.	8, 8.	Nerfs collatéraux palmaires fournis par le cubital.

Fig. 2. — 4^e Plan.

Préparation. — Coupez l'artère radio-palmaire et la cubitale vers la partie supérieure de la région ; rabattez-les de haut en bas et sectionnez les artères collatérales au niveau des commissures interdigitales. Faites de même pour les nerfs médian, cubital et pour les tendons du muscle fléchisseur sublime. Préparez, à la paume de main, les muscles lombrireaux et les tendons du fléchisseur profond des doigts. Terminez en enlevant, à l'éminence thénar, le court abducteur du pouce et, à l'éminence hypothénar, l'abducteur et le court fléchisseur du petit doigt.

EXPLICATION.

A, A.	Coupe de la peau.	O, O.	Artères collatérales des doigts.
B.	Tendon du muscle court extenseur du pouce.	p.	Nerf cubital.
C.	Tendon du muscle long abducteur du pouce.	q, q.	Nerfs collatéraux des doigts.
d.	Tendon du muscle grand palmaire.	<i>Parties contenues dans le 4^e plan.</i>	
E, E.	Muscle fléchisseur sublime au poignet.	a.	Ligament annulaire antérieur du carpe.
F.	Tendon du muscle petit palmaire.	b.	Faisceau superficiel du muscle court fléchisseur du pouce.
G.	Extrémité inférieure du cubital antérieur.	c.	Muscle opposant du pouce.
H, H.	Coupe du muscle court abducteur du pouce.	d.	Tendon du muscle long fléchisseur du pouce.
K, K.	Coupe du muscle adducteur du petit doigt.	e.	Muscle adducteur du pouce.
L, L.	Coupes des tendons du fléchisseur sublime à la main.	f.	Premier interosseux dorsal.
M.	Artère radio-palmaire.	g, g.	Tendons du muscle fléchisseur profond à la main.
N.	Artère cubitale.	h.	Tendon du muscle fléchisseur profond au médian.
		k, k.	Muscles lombrireaux.
		l.	Muscle court fléchisseur du petit doigt.
		m.	Muscle opposant du petit doigt.

PLANCHE 32.

RÉGION PALMAIRE.

Fig. 1. — 5° Plan.

Préparation. — Incisez longitudinalement le ligament annulaire antérieur du carpe; enlevez les tendons des muscles fléchisseurs des doigts, les lombrireaux, et préparez le ligament antérieur de l'articulation radio-carpienne ainsi que les muscles interosseux et l'adducteur du pouce. Terminez en découvrant complètement le premier et le cinquième métacarpiens par l'ablation des muscles opposants.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	<i>Parties contenues dans le 5° plan.</i>
A, A. Coupe de la peau.	a. Premier métacarpien.
R. Tendon du muscle court extenseur du pouce.	b. Face antérieure de l'articulation trapézo-métacarpienne.
C. Tendon du muscle long abducteur du pouce.	c. Ligament antérieur de l'articulation radio-carpienne.
D. Tendon du muscle grand palmaire.	d. Cinquième métacarpien.
E, E. Coupe des muscles fléchisseurs au poignet.	e. Face antérieure de l'articulation du cinquième métacarpien avec l'os crochu.
F. Extrémité inférieure du cubital antérieur.	f, f. Face postérieure de la gaine des tendons fléchisseurs.
i, i. Coupes des tendons du muscle fléchisseur sublime.	g. Faisceau profond du court fléchisseur du pouce.
II, II. Coupes des tendons du muscle fléchisseur profond des doigts.	h. Muscle adducteur du pouce.
K, K. Coupes du muscle court abducteur du pouce.	k. Premier interosseux dorsal.
L, L. Coupes du faisceau superficiel du muscle court fléchisseur du pouce.	l. Premier interosseux palmaire.
M. Coupe du muscle opposant du pouce.	m. Second interosseux dorsal.
N. Tendon du long fléchisseur du pouce.	n. Second interosseux palmaire.
O, O. Coupes des muscles abducteur et court fléchisseur du petit doigt.	o. Quatrième interosseux dorsal.
P. Artère radio-palmaire.	p. Troisième interosseux palmaire.
Q. Artère cubitale.	1. Artère radiale.
	2. Branche profonde de l'artère cubitale.
	3. Arcade palmaire profonde.
	4, 4. Artères interosseuses.
	7. Branche profonde ou interosseuse du nerf cubital.

Fig. 2. — 6° Plan.

Le meilleur moyen de se rendre un compte exact et complet du plan profond de cette région consiste à préparer les articulations du poignet et de la main. A dépliant de cette préparation, on pourra étudier la disposition des os sur une main montée artificiellement.

EXPLICATION.

a. Extrémité inférieure du radius.	o. Troisième métacarpien.
b. Extrémité inférieure du cubitus.	p. Quatrième métacarpien.
c. Scaphoïde.	q. Cinquième métacarpien.
d. Semi-lunaire.	r. Première phalange du pouce.
e. Pyramidal.	s, s. Première phalange des quatre derniers doigts.
f. Pisiforme.	t, t. Seconde phalange des quatre derniers doigts.
g. Trapèze.	u. Phalange unguéale du pouce.
h. Trapèzoïde.	v. Phalange unguéale des quatre derniers doigts.
k. Grand os.	
l. Os crochu.	
m. Premier métacarpien.	
n. Second métacarpien.	




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 2





Fig. 1



RÉGION DORSALE DU POIGNET ET DE LA MAIN.

Fig. 4. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

- A,B,C. Amputation dans l'articulation radio-carpienne. — Méthode elliptique. — Procédé à lambeau dorsal. — A,B. Extrémités du lambeau situées à 6 ou 7 millimètres au-dessous des apophyses styloïdes du radius et du cubitus. — C. Partie convexe du lambeau descendant jusqu'à 5 millimètres au-dessous de l'articulation carpo-métacarpienne du médius.
- D,E,F,G. Désarticulation du métacarpien du ponce. — Méthode ovale. — Procédé en raquette ou en Y. — D,E. Incision verticale qui commence à 12 millimètres au-dessous de l'article et descend à 3 centimètres au-dessous. — F,E,G. Incision ovale aboutissant à la commissure interdigitale.
- H,K,L,M. Désarticulation du deuxième métacarpien. — Méthode ovale. — Procédé en raquette. — Incision verticale remontant à quelques millimètres au-dessous de l'article et se terminant, en bas, par une incision ovale menée au niveau de la commissure interdigitale.
- N,O,P,Q. Désarticulation du cinquième métacarpien. — Méthode ovale. — Procédé en raquette. — L'incision verticale doit être faite sur le milieu de la face dorsale du métacarpien. — Les données sont les mêmes que pour la désarticulation du second métacarpien.
- R,S,T,U. Désarticulation d'un doigt. — Méthode ovale. — Procédé en raquette. — R,S. Incision verticale commençant à 7 ou 8 millimètres au-dessous de l'article. — T,S,U. Incision ovale menée au niveau de la commissure et allant passer, en avant, dans le pli digito-palmar.
- V,X. Amputation de la deuxième phalange d'un doigt. — Procédé à lambeau palmaire. — L'incision transversale doit correspondre à 3 ou 4 millimètres au-dessous de la saillie formée par l'extrémité de la première phalange.
- Y,Z. Amputation de la troisième phalange d'un doigt. — Procédé à lambeau palmaire. — L'incision transversale correspond à 2 millimètres au-dessous de la saillie formée par l'extrémité de la seconde phalange.

Fig. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Suivez, pour les incisions cutanées, le même ordre et la même direction qu'à la région palmaire. Vous aurez ici beaucoup plus de facilité à disséquer et à rabattre les lambeaux, à cause de la présence d'un fascia superficialis lamelleux dans lequel vous trouverez des veines superficielles et des rameaux nerveux en très-grand nombre. Après avoir isolé tous ces organes, préparez l'aponévrose dorsale et poursuivez, jusqu'à l'extrémité d'un doigt, le tendon extenseur et les prolongements fibreux qui l'accompagnent.

EXPLICATION.

- | | |
|--|---|
| A,A. Coupe de la peau. | g. Tendon du second radial externe. |
| B,B. Lambeaux comprenant la peau et le pannicule adipeux. | r,r. Muscles interosseux dorsaux, vus par transparence à travers l'aponévrose. |
| a. Aponévrose antibrachiale. | 1,1. Veines collatérales des doigts. |
| b. Ligament annulaire postérieur du carpe. | 2,2. Veines innominées de la face dorsale de la main et du poignet. |
| c. Aponévrose dorsale de la main. | 3. Veine céphalique du pouce. |
| d,d. Fibres transversales de cette aponévrose. | 4. Veine salvatelle. |
| e. Tendon de l'extenseur commun des-tiné à l'index. | 5,5. Filets du nerf brachial cutané interne. |
| f. Tendon de l'extenseur propre de l'index. | 6,6. Branche cutanée dorsale du nerf radial. |
| g. Tendon de l'extenseur commun des-tiné au médius. | 7,7. Rameaux cutanés fournis par cette branche. |
| h,h. Expansion latérale de ce tendon au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne. | 8,8. Nerfs collatéraux dorsaux fournis par la branche cutanée dorsale du nerf radial. |
| k. Bandelette moyenne de ce tendon s'insérant à la seconde phalange. | 9. Branche dorsale du nerf cubital. |
| l,l. Bandelettes latérales de ce tendon allant se fixer à la troisième phalange. | 10. Rameau cutané fourni par cette branche. |
| m. Tendon de l'extenseur commun des-tiné à l'annulaire. | 11,11. Nerfs collatéraux dorsaux fournis par le nerf cubital. |
| n,n. Tendons extenseurs du petit doigt. | 12. Branche anastomotique dorsale entre le nerf cubital et le nerf radial. |
| o. Tendon du long extenseur du pouce. | |
| p. Tendon du premier radial externe. | |

PLANCHE 34.

RÉGION DORSALE DU POIGNET ET DE LA MAIN.

Fig. 1. — 3^e Plan.

Préparation. — Enlevez tous les tendons qui constituent le plan superficiel et coupez-les transversalement au niveau de la limite supérieure du poignet. Préparez ensuite les muscles interosseux dorsaux et la face postérieure de l'articulation radio-cubio-carpienne, en ménageant les artères transverses et interosseuses.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	
A, A. Coupe de la peau.	b. Extrémité inférieure du cubitus.
B. Tendon du muscle court extenseur du pouce.	c. Ligament postérieur de l'articulation radio-cubio-carpienne.
C, C. Tendon du premier radial externe.	d. Muscle premier interosseux dorsal.
D, D. Tendon du second radial externe.	e. Second interosseux dorsal.
E, E. Muscle long extenseur du pouce.	f. Troisième interosseux dorsal.
F, F. Tendons de l'extenseur commun des doigts.	g. Quatrième interosseux dorsal.
G, G. Tendon de l'extenseur propre du petit doigt.	1. Artère radiale.
H, H. Tendon de l'extenseur propre de l'index.	2. Artère transverse postérieure du carpe.
K, K. Tendon du cubital postérieur.	3. Branche de l'artère interosseuse postérieure.
L. Extrémité externe du muscle adducteur du pouce.	4. Artère interosseuse dorsale du premier espace.
M. Muscle adducteur du petit doigt.	5. Artère interosseuse dorsale du second espace.
<i>Parties contenues dans le 3^e plan.</i>	
a. Extrémité inférieure du radius.	6, 6. Artères interosseuses dorsales du troisième et du quatrième espace.
	7. Rambeau artériel de la branche postérieure du nerf radial.

Fig. 2. — 4^e Plan.

EXPLICATION.

a. Extrémité inférieure du radius.	o. Troisième métacarpien.
b. Extrémité inférieure du cubitus.	p. Quatrième métacarpien.
c. Scaphoïde.	q. Cinquième métacarpien.
d. Semi-lunaire.	r. Première phalange du pouce.
e. Pyramidal.	s, s. Première phalange des quatre derniers doigts.
f. Pisiforme.	t, t. Seconde phalange des quatre derniers doigts.
g. Trapèze.	u. Phalange unguéale du pouce.
h. Trapézoïde.	v, v. Phalange unguéale des quatre derniers doigts.
k. Grand os.	
l. Os crochu.	
m. Premier métacarpien.	
n. Second métacarpien.	




Fig. 1.




Fig. 2.

Fig 1




Fig 2



Fig 3




Fig 4




PLANCHE 35.

COUPES DU POIGNET ET DE LA MAIN.

FIG. 1. — Coupe transversale dans l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras immédiatement au-dessus de l'articulation radio-carpienne.

EXPLICATION.

- | | |
|--|--|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
 B. Coupe de l'extrémité inférieure du radius.
 C. Coupe de la petite tête du cubitus.
 D. Coupe de l'apophyse styloïde du cubitus.
 a. Muscle petit palmar.
 b. Muscle grand palmar.
 c, c. Tendons du fléchisseur sublime.
 d, d. Tendons du fléchisseur profond.
 e. Long fléchisseur du ponce.
 f. Cubital antérieur.
 g. Tendons de l'extenseur commun.
 h. Extenseur propre du petit doigt.</p> | <p>k. Cubital postérieur.
 l. Extenseur propre de l'indicateur.
 m. Long extenseur du ponce.
 n. Long abducteur du ponce.
 o. Court extenseur du ponce.
 p. Premier radial externe.
 q. Second radial externe.
 1. Artère radiale.
 2. Artère cubitale.
 3, 3. Veines superficielles.
 4. Nerf médian.
 5. Nerf cubital.</p> |
|--|--|

FIG. 2. — Coupe transversale dans la première rangée des os du carpe.

EXPLICATION.

- | | |
|--|---|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
 B. Scaphoïde.
 C. Semi-lunaire.
 D. Pyramidal.
 E. Pisiforme.
 a. Muscle petit palmar.
 b. Muscle grand palmar.
 c. Tendon du fléchisseur sublime.
 d, d. Tendons du fléchisseur profond.
 e. Long fléchisseur du ponce.
 f. Tendon commun au cubital antérieur et à l'adducteur du petit doigt.
 g, g. Tendons de l'extenseur commun.</p> | <p>h. Extenseur propre du petit doigt.
 k. Cubital postérieur.
 l. Long abducteur du ponce.
 m. Court extenseur du ponce.
 n. Long extenseur du ponce.
 o. Premier radial externe.
 p. Second radial externe.
 1. Artère radiale.
 2. Artère cubitale.
 3, 3. Veines superficielles.
 4. Nerf cubital.
 5. Nerf médian.</p> |
|--|---|

FIG. 3. — Coupe transversale dans la seconde rangée des os du carpe.

EXPLICATION.

- | | |
|--|---|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
 B. Trapèze.
 C. Trapézoïde.
 D. Grand os.
 E. Os crochu.
 F. Extrémité supérieure du cinquième métacarpien.
 a. Muscles de l'éminence thénar.
 b. Muscles de l'éminence hypothénar.
 c. Grand palmar.
 d, d. Tendons du fléchisseur sublime.
 e, e. Tendons du fléchisseur profond.
 f. Long fléchisseur du ponce.</p> | <p>g, g. Tendons de l'extenseur commun.
 h. Extenseur propre du petit doigt.
 k. Long abducteur du ponce.
 l. Court extenseur du ponce.
 m. Long extenseur du ponce.
 n. Premier radial externe.
 o. Second radial externe.
 1. Artère radiale.
 2. Artère cubitale.
 3. Nerf médian.
 4. Nerf cubital.</p> |
|--|---|

FIG. 4. — Coupe transversale au milieu du métacarpe.

EXPLICATION.

- | | |
|--|---|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
 B. Premier métacarpien.
 C. Deuxième métacarpien.
 D. Troisième métacarpien.
 E. Quatrième métacarpien.
 F. Cinquième métacarpien.
 a. Court abducteur du ponce.
 b. Opposant du ponce.
 c. Faisceau superficiel du court fléchisseur du ponce.
 d. Faisceau profond du même muscle.
 e. Long fléchisseur du ponce.
 f. Adducteur du ponce.
 g. Premier interosseux palmar.
 h. Second interosseux palmar.
 k. Troisième interosseux palmar.</p> | <p>l, l. Tendons fléchisseurs des doigts.
 m, m. Lombricaux.
 n. Adducteur du petit doigt.
 o. Court fléchisseur du petit doigt.
 p. Opposant du petit doigt.
 q. Tendons extenseurs du ponce.
 r, r. Tendons extenseurs des doigts.
 s. Premier interosseux dorsal.
 t. Second interosseux dorsal.
 u. Troisième interosseux dorsal.
 v. Quatrième interosseux dorsal.
 1. Artère radiale.
 2, 2. Branches collatérales des doigtsournies par l'arcade palmar superficielle.
 3, 3. Veines superficielles.</p> |
|--|---|

PLANCHE 36.

RÉGION DE L'AINE (FACE ANTÉRIEURE).

1^{er} Plan (Côté droit de la figure).

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

- A, B. Ligature de l'artère iliaque externe. — Procédé d'A. Cooper. — Incision curviligne à concavité supérieure, dont l'extrémité interne commence au milieu du ligament de Fallope et dont l'extrémité externe aboutit à 4 centimètres en dedans de l'épine iliaque antérieure et supérieure.
- C, D. Ligature de l'artère fémorale au bas du triangle de Scarpa. — L'incision suit le trajet de l'artère et son milieu correspond à 11 ou 12 centimètres au-dessous de l'arcade crurale.


2^e Plan (Côté gauche de la figure).

Préparation. — Faites une première incision cutanée horizontale, étendue de l'épine iliaque antérieure et supérieure au bord externe du muscle droit de l'abdomen. De l'extrémité interne de cette incision, conduisez en une seconde qui descendra d'abord verticalement jusqu'au pubis, contournera ensuite la racine de la verge, enlamera la partie supérieure du scrotum et gagnera enfin la face antérieure de la cuisse pour se terminer au point de réunion des muscles contourner et moyen adducteur. Rabattez le lambeau de dedans en dehors et prenez bien soin de disséquer lentement, couche par couche, la peau et les deux lames sous-cutanées. Conservez les

vaisseaux et les nerfs superficiels, ainsi que les ganglions lymphatiques logés dans les graisses de la portion crurale de l'aine. Le dartos et le ventrier ne sont bien visibles que sur les sujets très-vigoureux.

EXPLICATION.

- | | |
|--|--|
| E, E. Coupe de la peau. | 2, 2. Branches de cette artère s'entourant entre les deux feuillets du fascia superficiels. |
| F. Lambeau comprenant la peau et le pannu adipeux. | 3, 3. Branches de l'artère honteuse externe. |
| a. Feuille profond du fascia superficiels faissé adhérent au lambeau dans cette portion de la préparation. | 4, 4. Veines légumentueuses abdominales. |
| b. Adhérences du fascia superficiels à l'arcade crurale. | 5. Veine saphène interne. |
| c. Aponevrose du muscle grand oblique. | 6. Veine dorsale de la verge. |
| d. Gaine celluleuse du muscle grand oblique | 7, 7. Rameaux perforants abdominaux des derniers nerfs intercostaux. |
| e. Petite portion de cette gaine disséquée et soulevée. | 8. Rameau scrotal de la grande branche, abdominale du plexus lombaire. |
| f. Fibres musculaires du grand oblique. | 9. Rameau de la branche inguinale interne (genito-crurale) du plexus lombaire. |
| g. Dartos. | 10, 10. Rameaux de la branche inguinale externe (fémorale cutanée externe) du plexus lombaire. |
| h. Ventrier. | 11, 11. Rameaux perforants du nerf crural. |
| k. Aponevrose de la cuisse. | |
| l. Graisse et ganglion lymphatiques superficiels. | |
| 1. Tronc de l'artère fémoraleuse abdominale. | |






PLANCHE 37.

RÉGION DE L'AINE (FACE ANTÉRIEURE).

3° Plan (côté gauche de la figure).

Préparation. — Mettez à nu les fibres musculaires du grand oblique et préparez l'aponévrose d'insertion de ce muscle en enlevant les fibres du dartos. Puis bas, dans la portion inguino-crurale de la région, vous commencerez la dissection par le côté externe et vous enlèverez le tissu adipeux ainsi que les ganglions lymphatiques superficiels en reliant plutôt qu'en coupant. Vous découvrirez ainsi : en dehors, le fascia lata ; au milieu, le fascia cribriformis, et en dedans, la gaine aponévrotique du muscle moyen adducteur.

EXPLICATION.

- | | |
|--|---|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
B. Épine iliaque antéro-supérieure.
a. Fibres musculaires du grand oblique.
b. Aponévrose d'insertion du grand oblique.
c. Feuillelet antérieur de la gaine du grand droit.
d. Feuillelet antérieur de la gaine du pyramidal.
e. Fibres arciformes de l'aponévrose du grand oblique.
f. Gaine celluleuse fournie au cordon des vaisseaux spermatisques par l'aponévrose du grand oblique.
g. Ligament suspenseur de la verge.
h. Gaine fibreuse de la verge.
i. Arcade crurale.
l. Fascia lata.
m. Fascia cribriformis.</p> | <p>n. Gaine aponévrotique du muscle moyen adducteur.
o. Ganglion lymphatique.
1. Artère sous-cutanée abdominale.
2, 2. Artères honteuses externes.
3, 3. Artères cutanées et ganglionnaires.
4. Veine saphène interne.
5, 5. Rameaux perforants abdominaux des derniers nerfs intercostaux.
6. Rameau scrotal de la grande branche abdominale du plexus lombaire.
7. Rameau crural de la branche inguinale interne (gêmito-crurale) du plexus lombaire.
8, 8. Rameaux de la branche inguinale externe (fémorale cutanée externe) du plexus lombaire.
9, 9. Rameaux perforants du nerf crural.</p> |
|--|---|

4° Plan (côté droit de la figure).

Préparation. — Détachez le feuillet antérieur de la gaine du grand droit, à la partie supérieure de la préparation ; renversez de haut en bas l'aponévrose du grand oblique et coupez-la parallèlement à l'arcade crurale, à une petite distance au-dessus de cette arcade. Enlevez la gaine celluleuse du cordon et découvrez l'anneau inguinal externe et ses deux piliers. Enfin, disséquez l'aponévrose de la cuisse et mettez à nu le triangle inguino-crural dans lequel vous préparerez la veine et l'artère crurale, tout en laissant en place la gaine fibreuse des muscles psoas et pectiné.

EXPLICATION.

- | | |
|---|---|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
B. Épine iliaque antéro-supérieure.
a. Coupe du feuillet antérieur de la gaine du grand droit.
b. Feuillelet postérieur de la gaine du pyramidal.
c. Muscle grand droit de l'abdomen.
d. Muscle pyramidal.
e. Muscle petit oblique de l'abdomen.
f. Portion inférieure de l'aponévrose du grand oblique.
g. Plier interne ou supérieur de l'anneau inguinal externe.
h. Plier externe ou inférieur de cet anneau.
i. Cordon des vaisseaux spermatisques recouvert du crémaster.
l. Arcade crurale.
m. Gaine aponévrotique du psoas (fascia iliaca).
n. Gaine aponévrotique du pectiné.
o. Ligament de Gimbernat.
p. Fascia lata.</p> | <p>q. Muscle couturier.
r. Muscle moyen adducteur ou premier adducteur.
s. Muscle droit interne.
t. Ganglion lymphatique placé entre le ligament de Gimbernat et la veine crurale.
u. Cloison cellulo-fibreuse interposée à la veine et à l'artère crurales.
1. Artère crurale.
2. Origine de l'artère épigastrique.
3. Origine de l'artère circonflexe iliaque.
4. Veine crurale.
5. Embouchure de la veine saphène interne.
6, 6. Rameaux perforants abdominaux des derniers nerfs intercostaux.
7. Rameau de la branche inguinale externe (fémorale cutanée externe) du plexus lombaire.
8, 8. Rameaux cutanés du nerf crural.
9. Rameau accessoire du nerf saphène interne.</p> |
|---|---|

PLANCHE 38.

RÉGION DE L'ANNE (FACE ANTÉRIEURE).

5^e Plan (Côté gauche de la figure).

Préparation. — Enlevez le muscle pyramidal. — Coupez transversalement le grand droit à la partie supérieure de la région, rabattez-le de haut en bas et conservez seulement son tendon inférieur. Renvoiez complètement l'aponévrose du grand oblique en avant, pour bien voir l'intérieur du canal inguinal. Rabattez le petit oblique de haut en bas et coupez-le, lorsqu'il ne vous sera plus possible de séparer ses fibres de celles du transverse. Enfin, enlevez la portion moyenne du couturier et préparez les branches superficielles que le nerf crural fournit dans le triangle inguino-crural.

EXPLICATION.


<i>Parties accessoires.</i>	
A, A. Coupe de la peau.	e. Feuillelet postérieur de la gaine du grand droit.
B, B. Coups du muscle droit.	f. Arcade de Douglas.
G. Ligament sus-penseur de la verge.	g. Fascia transversalis.
D. Gaine fibreuse de la verge.	h. Muscle pectiné.
E. Aponévrose du grand oblique renvoisée.	i. Psoas.
F. Fascia lata.	l. Muscle droit antérieur.
G, G. Coupes du couturier.	1. Artère épigastrique.
H. Moyen adducteur.	2. Branche de l'artère circumflexe iliaque.
	3. Artère crurale.
	4. Veine crurale.
<i>Parties contenues dans le 5^e plan.</i>	5. Grande branche abdominale du plexus lombaire.
a. Coupe de la portion supérieure du petit oblique.	6. Petite branche abdominale du plexus lombaire.
b. Portion inférieure du petit oblique.	7. Branche inguinale externe du plexus lombaire.
c. Crémastère.	8, 8. Rameaux du nerf crural.
d. Muscle transverse.	

6^e Plan (Côté droit de la figure).

Préparation. — La dissection portera seulement sur la portion inguino-crurale de la région, où vous enlèverez la partie moyenne des muscles pectiné, psoas, droit antérieur, et le paquet vasculo-nerveux, pour mettre à découvert la face antérieure de l'articulation coxo-femorale et la bourse séreuse du psoas.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	
A, A. Coupe de la peau.	S. Branche de l'artère circumflexe iliaque.
B. Muscle pyramidal.	T. Veine crurale.
C, C. Coupes du muscle grand droit de l'abdomen.	U, U. Rameaux des branches abdominales du plexus lombaire.
D. Muscle transverse.	V. Branche inguinale externe du plexus lombaire.
E. Feuillelet antérieur de la gaine du grand droit.	X. Coupe du nerf crural.
F. Feuillelet postérieur de la même gaine.	<i>Parties contenues dans le 6^e plan.</i>
G. Aponévrose du grand oblique.	a. Muscle tenseur du fascia lata.
H. Anneau inguinal externe.	b. Muscle vaste externe.
K. Crémastère.	c. Muscle petit adducteur (second adducteur) recouvert de sa gaine aponévrotique.
L. Fascia lata.	d. Bourse séreuse du psoas.
M, M. Coupes du couturier.	e. Face antérieure de la capsule articulaire.
N, N. Coupes du droit antérieur.	1. Artère femorale profonde.
O, O. Coupes du psoas.	2. Artère grande musculaire.
P, P. Coupes du pectiné.	3. Branche fournie au premier adducteur par le nerf obturateur.
Q. Muscle moyen adducteur (premier adducteur).	
R, R. Artère crurale.	






PLANCHE 39.

RÉGION DE L'AINE (FACE POSTÉRIEURE).

1^{er} Plan (côté gauche de la figure).

Préparation. — Coupez le bassin et l'abdomen suivant un plan vertical passant par la partie moyenne des deux crêtes iliaques. Déliez le grand lambeau formé par la paroi abdominale antérieure et la moitié antérieure du bassin, retournez-le sur une table, de façon à l'étudier par sa face postérieure, et débarrassez-le des viscères qui pourraient y adhérer, sans toucher à la vessie. Sur une des moitiés de la pièce, vous enlèverez le péritoine en le décollant avec les doigts. Cette coupe est longue et pénible à exécuter, mais elle a l'avantage de donner une idée exacte des différentes parties qui composent les plans profonds de la région inguinale.

EXPLICATION.

- a. Crête iliaque.
- b. Cavité cotyloïde.
- c. Muscle grand oblique.
- d. Muscle petit oblique.
- e. Muscle transverse.
- f. Muscle iliaque.
- g. Muscle psoas.

- h. Vessie.
- i. Ouraque.
- 1. Artère ombilicale.
- 2. Artère iliaque externe.
- 3. Artère épigastrique vue par transparence.
- 4. Veine iliaque externe.
- 5. Nerf crural.

2^e Plan (côté droit de la figure).

Préparation. — Ce plan se trouvera tout préparé lorsque vous aurez enlevé le péritoine.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A. Crête iliaque.
- B. Cavité cotyloïde.
- C. Muscle grand oblique.
- D. Muscle petit oblique.
- E. Muscle transverse.
- F. Muscle iliaque.
- G. Muscle psoas.
- H. Nerf crural.

- d. Arcade de Douglas.
- e. Ligne blanche.
- f. Muscle droit.
- g. Fascia transversalis.
- h. Anneau inguinal interne.
- k. Cordon des vaisseaux spermaticques.
- l. Randelette iléo-pubienne.
- m. Fascia iliac.
- 1. Artère iliaque externe.
- 2. Artère épigastrique.
- 3. Rambeau pubien de l'artère épigastrique.
- 4. Rambeau anastomotique avec l'artère ombilicale.
- 5. Veine iliaque externe.

Parties contenues dans le 2^e plan.

- a. Gaine celluleuse du transverse.
- b. Aponévrose du transverse.
- c. Péculet postérieur de la gaine du grand droit.

PLANCHE 40.

RÉGION DE L'AINE (PAGE POSTÉRIEURE).

3^e Plan (côté droit de la figure).

Préparation. — Commencez par enlever la vessie et l'ouraque; disséquez ensuite la face profonde du transverse jusqu'au bord externe du muscle droit, le long duquel vous couperez verticalement l'aponévrose du transverse. Enlevez la partie moyenne du muscle droit, en conservant toutefois une petite portion de l'extrémité inférieure avec le ligament sus-pubien qui la limite en arrière. Pour terminer, il ne vous restera plus qu'à nettoyer la bandelette iléo-pubienne et les tissus fibreux qui circonscrivent l'anneau crural.

EXPLICATION.

- Parties accessoires.*
- A. Crête iliaque.
 - B. Cavité coxyloïde.
 - C. Symphyse du pubis.
 - D. Trou sous-pubien.
 - E. Coupe du muscle grand oblique.
 - F. Coupe du petit oblique.
 - G. Muscle iliaque.
 - H. Muscle psoas.
 - I. Artère iliaque externe.
 - L. Artère obluratrice.
 - M. Artère circumflexe iliaque.
 - N. Veine iliaque externe.
 - O. Nef crural.

- Parties contenues dans le 3^e plan.*
- a. Muscle transverse.
 - b. Aponévrose du muscle transverse.
 - c. Feuille postérieur de la gaine du grand droit.
 - d. Feuille antérieur de la même gaine.
 - e. Ligne blanche.
 - f. Extrémité supérieure du muscle droit.
 - g. Extrémité inférieure du même muscle.
 - h. Ligament sus-pubien.
 - k. Cordon des vaisseaux spermadiques.
 - l. Fascia iliac.
 - m. Bandelette iléo-pubienne.
 - n. Ligament de Gimbernat.
 - o. Ligament de Cooper.


4^e Plan (côté gauche de la figure).

Préparation. — Enlevez complètement l'extrémité inférieure du muscle droit et le ligament sus-pubien, et mettez à nu le muscle grand oblique et son aponévrose, par l'ablation du transverse et du petit oblique.

EXPLICATION.

- Parties accessoires.*
- A. Crête iliaque.
 - B. Cavité coxyloïde.
 - C. Trou sous-pubien.
 - D. Muscle transverse.
 - E. Coupe du petit oblique.
 - F. Feuille postérieur de la gaine du muscle droit.
 - G. Extrémité supérieure du muscle droit.
 - H. Muscle iliaque.
 - K. Muscle psoas.
 - L. Fascia iliac.
 - M. Artère iliaque externe.
 - N. Artère obluratrice.
 - O. Veine iliaque externe.
 - P. Nef crural.

- Parties contenues dans le 4^e plan.*
- a. Muscle grand oblique.
 - b. Aponévrose du grand oblique.
 - c. Feuille antérieur de la gaine du muscle droit.
 - d. Ligne blanche.
 - e. Anneau inguinal externe.
 - f. a. Plier interne.
 - g. Plier externe.
 - h. Fibras arciformes.
 - k. Tendon du muscle droit.
 - l. Bandelette iléo-pubienne.
 - m. Ligament de Colles.
 - n. Ligament de Gimbernat.






PLANCHE 41.

RÉGION FESSIÈRE.

1^{er} Plan (côté gauche de la figure).

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

A.B. Ligature de l'artère fessière. — Procédé de Vidal. — Joindre par une ligne idéale la pointe du coccyx au point le plus élevé de la crête iliaque. Sur le milieu de cette ligne, élever une perpendiculaire. L'incision suivra la direction de cette perpendiculaire; elle aura 8 ou 10 centimètres de long, et son milieu correspondra au point d'entrecroisement des deux lignes.

C.D. Résection de la tête du fémur. — Procédé de Sédillot. — Incision curviligne circonscrivant le grand trochanter et formant un lambeau de 10 centimètres de largeur à la base.

2^e Plan (côté droit de la figure).

Préparation. — Couchez le sujet sur le ventre et placez un billot sous le bassin pour bien tendre les parties à disséquer. Menez deux incisions horizontales : l'une un peu au-dessus de la crête iliaque, l'autre un peu au-dessous du pli de la fesse. Joignez-les par une incision verticale médiane. Arrivez du premier coup sur l'aponévrose sacro-lombaire, ou sur l'aponévrose de la cuisse si vous commencez la préparation par le bas. Renversez de dedans en dehors le lambeau cutané et conservez toutes les ramifications vasculaires et nerveuses superficielles. Suivez rigoureusement la direction des fibres du grand fessier. Vous terminerez la dissection lorsque vous aurez découvert la face externe du grand trochanter.

EXPLICATION.

A,A. Coupe de la peau.	g. Insertion inférieure du grand fessier sur l'aponévrose de la cuisse.
B. Lambeau comprenant la peau et la couche sous-cutanée.	1,1. Branches de l'artère iléo-lombaire.
C. Grand trochanter.	2,2. Branches superficielles des artères fessière et ischiatique.
a. Extrémité inférieure du muscle grand oblique de l'abdomen.	3,3. Rameaux postérieurs des artères circonflexes.
b. Aponévrose sacro-lombaire.	4,4. Rameaux de la branche inguinale externe (fémoro-cutanée) du plexus lombaire.
c. Aponévrose de la cuisse.	5,5. Branches ascendantes ou fessières du petit nerf sciatique.
d. Aponévrose du muscle moyen fessier.	6. Branche descendante ou crurale du petit nerf sciatique.
e. Adhérences de l'aponévrose du grand fessier avec la couche sous-cutanée.	
f. Muscle grand fessier.	

PLANCHE 42.

RÉGION FESSIÈRE.

3^e Plan (Côté gauche de la figure).

Préparation. — Coupez le muscle grand fessier vers son milieu et perpendiculairement à la direction de ses fibres. Rabattez le lambeau supérieur de bas en haut et détachez-le de ses insertions. Quant au lambeau inférieur, vous le couperez transversalement sur la limite inférieure de la région et vous l'enlèverez. Après avoir étudié en place l'aponévrose profonde du grand fessier, vous la détacherez et vous préparerez le plan musculaire constitué par le moyen fessier et les muscles pelvi-trochantériens. Cette préparation demande du temps, mais elle ne présente point de difficulté sérieuse.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A, A. Coupe de la peau.
- B. Crête iliaque.
- C. Grand trochanter.
- D. Aponévrose sacro-lombaire.
- E. Coupe du grand fessier.

Parties contenues dans le 3^e plan.

- a. Tubérosité sciatique.
- b. Muscle moyen fessier.
- c. Muscle pyramidal.
- d. Muscle jumeau supérieur.
- e. Muscle jumeau inférieur.
- f. Tendon de l'obturateur interne.

- g. Carré crural.
- h. Aponévrose de l'obturateur interne.
- k. Grand ligament sacro-sciatique.
- l. Extrémité supérieure du biceps, du demi-membraneux et du demi-tendineux.
- 1. Artère fessière.
- 2. Artère ischiatique.
- 3. Artère honteuse interne.
- 4. Rameau postérieur des artères circonflexes.
- 5. Grand nerf sciatique.
- 6. Petit nerf sciatique.
- 7. Branche transverse ou périnéale du petit nerf sciatique.
- 8. Nerf du muscle pyramidal.

4^e Plan (Côté droit de la figure).

Préparation. — Enlevez le moyen fessier et préparez le petit fessier qui lui est sous-jacent. Vous aurez soin de ménager les branches du nerf fessier supérieur qui rampent sur la face superficielle du muscle petit fessier.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A, A. Coupe de la peau.
- B. Crête iliaque.
- C. Grand trochanter.
- D. Aponévrose sacro-lombaire.
- E. Coupe du grand fessier.
- F. Coupe du moyen fessier.
- G. Grand ligament sacro-sciatique.

Parties contenues dans le 4^e plan.

- a. Tubérosité sciatique.
- b. Muscle petit fessier.
- c. Muscle pyramidal.
- d. Muscle jumeau supérieur.

- e. Muscle jumeau inférieur.
- f. Tendon de l'obturateur interne.
- g. Muscle carré crural.
- h. Muscle ischio-coccygien.
- k. Muscle obturateur interne.
- l. Extrémité supérieure du biceps, du demi-membraneux et du demi-tendineux.
- 1. Artère fessière.
- 2. Artère ischiatique.
- 3. Rameau postérieur des artères circonflexes.
- 4. Nerf fessier supérieur.
- 5. Grand nerf sciatique.
- 6. Petit nerf sciatique.
- 7. Branche transverse ou périnéale du petit nerf sciatique.




Fig 2.




Fig 1.




PLANCHE 43.

ARTICULATION DE LA HANCHE.

La préparation des articulations du bassin ne saurait être l'objet d'aucune recommandation spéciale. Il s'agit simplement de mettre à nu les différents ligaments tout en conservant les attaches des principaux muscles péri-articulaires. On gagnera beaucoup de temps en employant, pour cette préparation, une pièce sur laquelle on aura déjà disséqué les régions inguino-crurale et fessière. Après avoir étudié la surface extérieure de la capsule coxo-fémorale, on divisera circulairement cette capsule pour mettre à découvert les parties profondément situées.

FIG. 1. — Face antérieure.

EXPLICATION.

A. Corps de la quatrième vertèbre lombaire.	d. Face antérieure de la capsule coxo-fémorale.
B. Corps de la cinquième vertèbre lombaire.	e. Ligament de Bertin.
C. Angle sacro-vertébral (promontoire).	f. Membrane obturatrice.
D. Sacrum.	g. Muscle couturier.
E. Crête iliaque.	h. Muscle droit antérieur.
F. Épine iliaque antéro-supérieure.	k. Extrémité inférieure du moyen fessier.
G. Épine iliaque antéro-inférieure.	l. Tendon du petit fessier.
H. Corps du pubis.	m. Muscle vaste externe.
K. Branche ischio-pubienne.	n. Muscle vaste interne.
L. Corps du fémur.	o. Muscle psoas.
M. Grande échancreure sciatique.	p. Muscles biceps, demi-membraneux et demi-tendineux allant s'insérer à la tubérosité sciatique.
a. Ligament iléo-lombaire.	q. Muscle grand adducteur.
b. Ligament sacro-iliaque supérieur.	r. Muscle moyen adducteur.
c. Ligament sacro-iliaque antérieur.	s. Pectiné.

FIG. 2. — Face postérieure.

EXPLICATION.

A. Sacrum.	k. Face postérieure de la capsule coxo-fémorale.
B. Coccyx.	l. Extrémité supérieure du droit antérieur.
C. Crête iliaque.	m. Tendon direct du droit antérieur.
D. Fosse iliaque externe.	n. Tendon réfléchi du même muscle.
E. Épine iliaque antéro-supérieure.	o. Muscle couturier.
F. Tubérosité de l'ischion.	p. Tendon de l'obturateur interne.
G. Symphyse pubienne.	q. Muscle carré crural.
H. Grand trochanter.	r. Insertion fémorale du muscle grand fessier.
K. Petit trochanter.	s. Muscle vaste externe.
a. Ligament sacro-iliaque postérieur.	t. Muscle vaste interne.
b. Ligament sacro-épineux.	u. Insertion du psoas au petit trochanter.
c. Ligament sacro-coccygien postérieur.	x. Muscles biceps et demi-tendineux réunis.
d. Grand ligament sacro-sciatique.	y. Muscle demi-membraneux.
e. Petit ligament sacro-sciatique.	
f. Grande échancreure sciatique.	
g. Petite échancreure sciatique.	
h. Membrane obturatrice.	

PLANCHE 44.

RÉGION FÉMORALE ANTÉRIEURE.

1^{er} Plan.

NÉDECINE OPÉRATOIRE.

- A.B. Ligature de l'artère fémorale à son origine. — Incision verticale de 6 à 8 centimètres, dont le point de départ correspond au milieu de l'arcade crurale.
- C.D. Ligature de l'artère fémorale à sa partie moyenne. — Incision de 8 centimètres sur le trajet d'une ligne menée du milieu de l'arcade crurale à l'union du tiers inférieur avec le tiers moyen du bord interne de la cuisse.
- E.F. Ligature de l'artère fémorale dans le canal du troisième adducteur. — Incision de 8 centimètres sur le trajet de l'artère, immédiatement en avant du tendon du troisième adducteur. Le milieu de cette incision doit correspondre à l'union du tiers inférieur avec le tiers moyen du bord interne de la cuisse. On fléchira la jambe sur la cuisse et l'on fera reposer cette dernière sur sa face externe.
- G.H. Amputation dans l'articulation coxo-fémorale. — Procédé à un lambeau de Lalouette. — La base du lambeau s'arrête, en dehors, au grand trochanter, et en dedans, à la tubérosité de l'ischion.
- K.L. Amputation de la cuisse à la partie moyenne. — Procédé à lambeau antérieur. — La base du lambeau doit comprendre presque les deux tiers de la circonférence du membre ; sa hauteur doit égaler au moins le tiers de cette circonférence.
- M.N. Résection de l'articulation fémoro-tibiale. — Procédé de Syme. — Circonscrire la rotule par deux incisions courbes menées : l'une au-dessus, l'autre au-dessous de cet os. Ces deux incisions se regardent par leur concavité ; leurs extrémités se rejoignent au niveau des ligaments latéraux de l'articulation.






PLANCHE 45.

RÉGION FÉMORALE ANTÉRIEURE.

2^e Plan.

Préparation. — Faites d'abord deux incisions horizontales : l'une à 10 centimètres au-dessous de l'arcade crurale, l'autre à deux ou trois travers de doigt au-dessus du bord supérieur de la rotule. Ces deux incisions comprendront seulement la moitié antérieure de la circonférence du membre. Joignez-les par une incision verticale médiane. Rabattez de chaque côté les deux lambeaux comprenant la peau et le tissu adipeux sous-cutané, et mettez à nu l'aponévrose d'enveloppe, en conservant avec soin les ramifications vasculaires et nerveuses qui rampent dans l'épaisseur du fascia superficialis. Pour bien voir toutes les veines superficielles, il est nécessaire de pousser une injection dans les deux veines saphènes au niveau des malléoles.

EXPLICATION.

- | | |
|---|--|
| A,A. Coupe de la peau. | 3. Veine saphène interne. |
| B,B. Lambeaux comprenant la peau et le pannicule adipeux. | 4,4. Veines superficielles innommées de la face antérieure de la cuisse. |
| <i>a.</i> Aponévrose fémorale (aponévrose d'enveloppe). | 5,5. Rameaux du nerf inguinal externe (fémoro-cutané). |
| <i>b.</i> Fascia lata. | 6,6. Rameaux perforants du nerf crural. |
| 1,1. Artérioles fournies par l'artère crurale. | 7. Rameau accessoire du nerf saphène interne. |
| 2,2. Artérioles fournies par la grande musculaire. | |

PLANCHE 46.

RÉGION FÉMORALE ANTÉRIEURE.

3^e Plan.

Préparation. — Enlevez l'aponévrose d'enveloppe, coupez transversalement le muscle tenseur du fascia lata à la partie supérieure de la préparation. Il vous suffira ensuite d'ouvrir les gaines aponévrotiques de chaque muscle et d'enlever le tissu conjonctif qui remplit les espaces intermusculaires.

EXPLICATION.

- | | |
|---|---|
| A, A. Coupe de la peau. | f. Droit antérieur. |
| a. Muscle tenseur du fascia lata. | g. Vaste externe. |
| b. Muscle couturier. | h. Vaste interne. |
| c. Muscle moyen adducteur. | 1, 1. Artérioles musculaires fournies par l'artère crurale. |
| d. Muscle droit interne. | 2. Artériole fournie par l'articulaire supérieure interne. |
| e. Tendon commun des trois portions du triceps. | |




PLANCHE 47.
RÉGION FÉMORALE ANTÉRIEURE.

4^e Plan (côté externe).

Préparation. — Coupez transversalement le droit antérieur et le vaste externe à la partie supérieure de la région, rabattez-les de haut en bas et coupez-les un peu au-dessus de leur tendon commun, après avoir découvert le muscle vaste interne et l'aponévrose intermusculaire externe. Vous préparerez ensuite les branches vasculaires et nerveuses qui rampent sur la face superficielle du vaste interne.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A,A. Coupe de la peau.
- B. Coupe du muscle tenseur du fascia lata.
- C. Coupe du couturier.
- D. Muscle moyen adducteur.
- E. Tendon commun du triceps.
- F,F. Coupes du droit antérieur.
- G,G. Coupes du vaste externe.

Parties contenues dans le 4^e plan.

- a. Aponévrose intermusculaire externe.
- b. Muscle vaste interne.
- 1,1. Branches de la grande artère musculaire.
- 2,2. Rameaux du nerf crural destinés au vaste externe.

PLANCHE 48.

RÉGION FÉMORALE ANTÉRIEURE.

4^e Plan (côté interne).

Préparation. — Faites reposer la cuisse sur sa face externe. Enlevez la partie moyenne des muscles couturier, droit interne, moyen et petit adducteur, de façon à mettre à découvert le vaste interne et la face antérieure du grand adducteur. Disséquez ensuite l'artère crurale et ses branches, la veine crurale et les rameaux principaux du nerf crural.

EXPLICATION.

Parties accessoires.


- A,A. Coupe de la peau.
- B,B. Coupes du droit antérieur.
- C,C. Coupes du couturier.
- D,D. Coupes du droit interne.
- E,E. Coupes du moyen adducteur.
- F. Insertion fémorale du petit adducteur.

Parties contenues dans le 4^e plan.

- a. Muscle vaste interne.
- b. Grand adducteur.
- c. Paroi antérieure du canal formé par le grand adducteur.

d. Muscle demi-tendineux.

- 1,1. Artère crurale.
- 2,2. Branches de la grande artère musculaire.
- 3,3. Artérioles destinées au grand adducteur.
- 4. Artère articulaire supérieure interne (grande anastomotique).
- 5,5. Veine crurale.
- 6,6. Rameaux du nerf crural destinés au vaste interne.
- 7,7. Nerf saphène interne.
- 8. Nerf de la gaine des vaisseaux cruraux.
- 9,9. Branches du nerf obturateur destinées aux muscles adducteurs.






PLANCHE 49.

RÉGION FÉMORALE POSTÉRIEURE.

1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

- A.B. Ligature de l'artère ischiatique. — L'artère se trouve à l'union du tiers postérieur avec les deux tiers antérieurs d'une ligne qui joindrait l'épine iliaque postéro-inférieure au sommet du grand trochanter. — Sur ce point pris comme milieu, on tracera une incision de 8 ou 10 centimètres dans la direction des fibres du grand fessier. — La même incision, légèrement portée en arrière, permet d'arriver sur l'artère honteuse interne.
- C.D.E. Amputation de la cuisse à la partie moyenne. — Procédé à lambeau antérieur. — C.D. Extrémité externe de la base du lambeau. — D.E. Incision horizontale postérieure.
- F.G.H. Amputation dans l'articulation coxo-fémorale. — Procédé en raquette. — F.G. Incision verticale de 8 centimètres, commençant à 2 centimètres au-dessus du grand trochanter. — G.H. Incision oblique postérieure allant passer à 2 ou 3 centimètres au-dessus de la tubérosité sciatique.

PLANCHE 50.


RÉGION FÉMORALE POSTÉRIEURE.

2^e Plan.

Préparation. — Limitez la région par deux incisions horizontales : l'une menée suivant le pli de la fesse ou un peu au-dessous ; l'autre dans la direction d'une ligne circulaire passant à deux ou trois travers de doigt au-dessus de la rotule. Une incision verticale médiane vous permettra de rabattre de chaque côté un lambeau comprenant la peau et le pannicule adipeux. Vous préparerez ensuite les veinules et les rameaux nerveux sous-cutanés, et vous mettrez à découvert l'aponévrose d'enveloppe.

EXPLICATION.

A,A. Coupe de la peau.	1,1. Veines superficielles innommées de la face postérieure de la cuisse.
B,B. Lambeaux comprenant la peau et le pannicule adipeux sous-cutané.	2,2. Rameaux postérieurs du nerf inguinal externe (fémoro-cutané).
a. Aponévrose fessière.	3. Branche fessière cutanée du petit nerf sciatique.
b. Aponévrose fémorale.	4,4,4. Rameaux cutanés fémoraux du petit nerf sciatique.






PLANCHE 51.

RÉGION FÉMORALE POSTÉRIEURE.

3^e Plan.

Préparation. — Enlevez l'aponévrose d'enveloppe; il vous sera ensuite extrêmement facile de préparer la couche musculaire superficielle. Vous aurez seulement le soin de conserver la branche fémorale et la branche périnéale du petit nerf sciatique, qui sont toutes deux sous-aponévrotiques.

EXPLICATION.

A, A. Coupe de la peau.

a. Aponévrose inter-musculaire externe.

b. Extrémité inférieure du muscle grand fessier.

c. Longue portion du biceps fémoral.

d. Muscle demi-tendineux.

e, e. Muscle demi-membraneux.

f. Muscle droit interne.

g. Extrémité inférieure du couturier.

1, 1. Rameaux postérieurs de l'artère fémorale profonde.

2. Branche périnéale du petit nerf sciatique.

3. Branche fémorale du même nerf.

PLANCHE 52.

RÉGION FÉMORALE POSTÉRIEURE.

4^e Plan.

Préparation. — Coupez transversalement sur les limites de la région : l'extrémité inférieure du grand fessier, la longue portion du biceps, le demi-tendineux, le demi-membraneux et le droit interne. Enlevez la portion moyenne de ces muscles. Le plan que vous découvrirez sera constitué en dedans par le muscle grand adducteur, en dehors par l'aponévrose inter-musculaire externe et la courte portion du biceps. Il vous restera à enlever une couche ordinairement assez épaisse de tissu conjonctif au milieu duquel sont enfouis : le nerf sciatique et ses branches, quelques rameaux artériels peu volumineux, et en bas l'extrémité supérieure de la veine poplitée.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A,A. Coupe de la peau.
- B,B. Coupe du grand fessier.
- C,C. Coupe de la longue portion du biceps.
- D,D. Coupe du demi-tendineux.
- E. Extrémité supérieure du demi-membraneux.
- F,F. Extrémité inférieure du même muscle.
- G,G. Coupe du droit interne.
- H. Muscle couturier.

Parties contenues dans le 4^e plan.

- a. Aponévrose inter-musculaire externe.
- b. Courte portion du biceps.
- c. Muscle grand adducteur.
- 1,1. Rameaux perforants de l'artère fémorale profonde.
- 2. Veine poplitée.
- 3. Tronc du nerf sciatique.
- 4. Nerf sciatique poplité interne.
- 5. Nerf sciatique poplité externe.
- 6,6. Branches musculaires du grand nerf sciatique.




Fig. 1.



Fig. 2



Fig. 3



PLANCHE 53.

COUPES DE LA CUISSE.

FIG. 1. — Coupe transversale immédiatement au-dessous de la base du grand trochanter.

EXPLICATION.

A, A. Coupe de la peau.	l. Petit adducteur.
B. Corps du fémur.	m. Grand adducteur.
a, a. Aponévrose d'enveloppe.	n. Extrémité supérieure des muscles biceps, demi-tendineux et demi-membraneux.
b. Muscle tenseur du fascia lata.	o. Grand fessier.
c. Couturier.	1. Artère fémorale.
d. Psoas.	2. Veine fémorale.
e. Droit antérieur.	3. Veine saphène interne.
f. Vaste externe.	4, 4. Veines superficielles de la face postérieure de la cuisse.
g. Moyen adducteur.	5. Grand nerf sciatique.
h. Droit interne.	6. Petit nerf sciatique.
k. Pectiné.	

FIG. 2. — Coupe transversale à la partie moyenne de la cuisse.

EXPLICATION.

A, A. Coupe de la peau.	k. Droit interne.
B. Corps du fémur.	l. Demi-tendineux.
a, a. Aponévrose d'enveloppe.	m. Demi-membraneux.
b. Muscle couturier.	n. Biceps.
c. Droit antérieur.	1. Artère fémorale.
d. Vaste externe.	2. Veine fémorale.
e. Vaste interne.	3. Veine saphène interne.
f. Moyen adducteur.	4. Grand nerf sciatique.
g. Petit adducteur.	5. Branche fémorale du petit nerf sciatique.
h. Grand adducteur.	

FIG. 3. — Coupe transversale au tiers inférieur de la cuisse.

EXPLICATION.

A, A. Coupe de la peau.	h. Demi-tendineux.
B. Corps du fémur.	k. Demi-membraneux.
a, a. Aponévrose d'enveloppe.	l. Longue portion du biceps.
b. Tendon du droit antérieur.	m. Courte portion du biceps.
c. Vaste interne.	1. Artère fémorale.
d. Vaste externe.	2. Veine fémorale.
e. Extrémité inférieure du grand adducteur.	3. Veine saphène interne.
f. Couturier.	4. Grand nerf sciatique.
g. Droit interne.	

PLANCHE 54.

RÉGION FÉMORO-TIBIALE ANTÉRIEURE.

Fig. 1. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

A. B. Amputation dans l'articulation fémoro-tibiale. — Procédé de l'auteur. — Incision curviligne dont la partie moyenne descend à trois travers de doigt au-dessous de la tubérosité antérieure du tibia, et dont les parties latérales vont passer à deux travers de doigt au-dessous d'une ligne horizontale menée par la même tubérosité.

C. D. E. F. Résection de l'articulation fémoro-tibiale. — Procédé de Park. — C. D. Incision verticale médiane. — E. F. Incision transversale menée au-dessus du bord supérieur de la rotule.

Fig. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Faites d'abord deux incisions horizontales, l'une à deux ou trois travers de doigt au-dessus du bord supérieur de la rotule, l'autre à égale distance au-dessous de la tubérosité antérieure du tibia. Réunissez-les par une incision verticale médiane, mais ayez soin que cette dernière ne dépasse pas, en profondeur, l'épaisseur de la peau, afin de ménager plus sûrement la bourse séreuse prérotulienne. Rabattez de chaque côté les deux lambeaux quadrangulaires cutanés, en

mettant à nu l'aponévrose d'enveloppe et en préparant, au fur et à mesure, les branches vasculaires et nerveuses superficielles. Pour voir la bourse prérotulienne, il importe de prendre quelques précautions en disséquant la portion du tégument qui correspond à la rotule : vous raserez la face profonde du derme avec le tranchant du scalpel, de façon à laisser adhérer à la rotule tout le tissu conjonctif sous-cutané. Il vous sera ensuite facile de rendre la bourse séreuse apparente, soit en insufflant au moyen d'un tube de verre effilé, soit en y poussant une injection solidifiable.

EXPLICATION.

A. A. Coupe de la peau.	1.	Fibres musculaires du vaste externe.
B, B. Lambeaux comprenant la peau et le pannicule adipeux.	1, 1.	Branches superficielles des artères artérielles supérieures.
a. Bourse séreuse prérotulienne ouverte.	2, 2.	Branches superficielles des artères artérielles inférieures.
b. Aponévrose fémorale.	3.	Rampan de l'artère récurrente tibiale antérieure.
c. Lambeau formé par la gaine aponévrotique du vaste interne.	4.	Veine saphène interne.
d. Portion de l'aponévrose qui recouvre le tendon du droit antérieur.	5, 5.	Veines superficielles innomées.
e. Lambeau formé par la gaine aponévrotique du vaste externe.	6, 6.	Rameaux du nerf inguinal externe (fémoro-cutané).
f, f. Alvéoles ou ligaments de la rotule.	7, 7.	Branches fournies par les rameaux perforants du nerf crural.
g. Fibres terminales du fascia lata.		
h. Aponévrose jambière.	8.	Branches antérieures (sous-rotulienne) du nerf saphène interne.
k. Fibres musculaires du vaste interne.		

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig 1




Fig 2





PLANCHE 55.

RÉGION FÉMORO-TIBIALE ANTÉRIEURE.

FIG. 1. — 3° Plan.

Préparation. — Coupez transversalement le triceps sur la limite supérieure de la préparation et retranchez-en toute la partie charnue. Enlevez ensuite l'aponévrose d'enveloppe, de façon à découvrir : 1° la face antérieure de la rotule et le ligament rotulien, 2° les expansions fibreuses que le tendon du triceps envoie au-devant de l'articulation fémoro-tibiale, 3° la patte d'oie, 4° l'extrémité supérieure du muscle jambier antérieur. Vous terminerez en enlevant une portion de ce dernier muscle pour voir le nerf tibial antérieur, l'artère récurrente tibiale et la partie supérieure du ligament interosseux.

EXPLICATION.

- Parties accessoires.*
- A. A. Coupe de la peau.
 - B. Aponévrose fémorale.
 - C. Coupe du vaste interne.
 - D. Coupe du vaste externe.
 - E. Aponévrose jambière.
- Parties contenues dans le 3° plan.*
- a. Corps du fémur.
 - b. Rotule.
 - c. Tubérosité antérieure du tibia.
 - d. Muscle sous-crural.
 - e. Aponévrose inter-musculaire interne.
 - f. Aponévrose inter-musculaire externe.

- g. Tendon du droit antérieur.
- h. Ligament rotulien.
- k. Tendon du vaste interne.
- l. Tendon du vaste externe.
- m, n. Expansions fibreuses du tendon du triceps.
- n. aponévrose de la patte d'oie.
- o. Coupe du jambier antérieur.
- p. Ligament interosseux.
- 1, 1. Branches des artères artérielles supérieures.
- 2, 2. Branches des artères artérielles inférieures.
- 3. Artère récurrente tibiale antérieure.
- 4. Nerf tibial antérieur.

FIG. 2. — Articulations du genou.

Préparation. — Si l'on veut se faire une bonne idée de l'étendue de la synoviale, il faut, avant de commencer la dissection, perforer la rotule à sa partie moyenne et insuffler l'articulation. Après avoir rebouché l'ouverture avec une petite cheville ou un morceau de cire, on disséquera successivement tous les muscles périarticulaires et on les enlèvera, en les coupant près de leurs insertions. Il s'agit, en un mot, d'arriver sur les ligaments périarticulaires. Le seul point un peu délicat est de rabattre l'extrémité inférieure du triceps sans ouvrir le cul-de-sac supérieur de la synoviale.

EXPLICATION.

- a. Corps du fémur.
- b. Condyle interne.
- c. Condyle externe.
- d. Corps du tibia.
- e. Tubérosité interne.
- f. Tubérosité antérieure.
- g. Corps du péroné.
- h. Tête du péroné.
- i. Face postérieure de la rotule.
- m. Tendon du triceps.

- n. n. Ligament rotulien.
- o. Ligament latéral interne (fémoro-tibial).
- p. Ligament latéral externe (fémoro-péronier).
- q. Cartilage semi-lunaire interne.
- r. Cartilage semi-lunaire externe.
- s. Ligament croisé antérieur.
- t. Cul-de-sac supérieur de la synoviale.
- u. Ligament tibio-péronier antérieur.

PLANCHE 56.

RÉGION FÉMORO-TIBIALE POSTÉRIEURE (GREUX POPLITÉ).

FIG. 1. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

A.B. Ligature de l'artère poplitée à sa partie inférieure. — Incision verticale de 10 centimètres partant du milieu de l'espace poplitée.
C, D. Amputation dans l'articulation fémoro-tibiale. — Procédé de Baudens. — Moitié postérieure de l'incision intéressant seulement la peau (voy. pl. 54, fig. 1).

FIG. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Incisez la peau suivant deux lignes horizontales menées sur les limites supérieure et inférieure de la région. Faites ensuite une incision verticale

médiante et disséquez les deux lambeaux, en ménageant les branches superficielles du petit sciatique qui rampent dans la couche sous-cutanée. La veine saphène externe et les nerfs qui l'accompagnent ne peuvent être aperçus qu'après l'ablation de l'aponévrose qui les recouvre.

EXPLICATION.

A, A. Coupe de la peau.	2. Branche superficielle des artères jumelles.
B, B. Lambeau comprenant la peau et le pannicule adipeux.	3. Veine saphène externe.
a. Aponévrose fémorale.	4. Petite veine sous-aponévrotique.
b, b. Lambeaux formés par l'aponévrose poplitée.	5, 5. Rampeaux fournis par la branche fémorale du petit nerf sciatique.
c. Aponévrose jambière.	6. Nerf saphène tibial (racine interne du nerf saphène externe).
d. Muscle jumeau externe.	7. Nerf saphène péronier (racine externe du nerf saphène externe).
e. 1. Artérioles destinées à la peau.	




Fig. 1.




Fig. 2.

Fig. 2





Fig. 1



RÉGION FÉMORO-TIBIALE POSTÉRIEURE (CREUX POPLITÉ).

FIG. 4. — 3^e Plan.

Préparation. — Enlevez l'aponévrose d'enveloppe et disséquez la couche sous-jacente, en évitant de changer les rapports des muscles, ce qui sera facile, si vous vous bornez à enlever le tissu conjonctif qui les recouvre, sans toucher à celui qui leur est interposé. Vous conserverez la veine saphène externe et les nerfs superficiels.

EXPLICATION.

- | | |
|--|--|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
 a. Longue portion du biceps fémoral.
 b. Muscle demi-tendineux.
 c, c. Muscle demi-membraneux.
 d. Tendon du droit interne.
 e. Muscle jumeau externe.
 f. Muscle jumeau interne.
 1. Branche superficielle des artères jumelles.
 2. Veine saphène externe.</p> | <p>3. Veine poplitée.
 4. Nerf sciatique poplité interne.
 5. Nerf sciatique poplité externe.
 6. Branche cutanée péronière.
 7. Nerf saphène externe.
 8. Nerf saphène tibial (racine interne du nerf saphène externe).
 9. Nerf saphène péronier (racine externe du nerf saphène externe).</p> |
|--|--|

FIG. 2. — 4^e Plan.

Préparation. — Coupez le demi-tendineux et le demi-membraneux sur la limite supérieure de la région, rabattez-les de haut en bas et conservez seulement l'extrémité inférieure du demi-tendineux. Enlevez de même la longue portion du biceps, mais laissez en place la courte portion de ce muscle. Dans le triangle inférieur du creux poplité, conservez l'extrémité supérieure des deux jumeaux. Vous aurez ensuite à enlever une masse considérable de tissu adipeux, au milieu de laquelle vous préparerez les vaisseaux et les nerfs de la région, l'aponévrose postérieure du grand adducteur, le muscle plantaire grêle et la partie supérieure du soléaire.

EXPLICATION.

- | | |
|--|--|
| <p>A, A. Coupe de la peau.
 B, B. Coupe de la longue portion du biceps.
 C. Coupe supérieure du demi-membraneux.
 D, D. Coupes du demi-tendineux.
 E, E. Coupes du jumeau externe.
 F, F. Coupes du jumeau interne.
 G, G. Racines du nerf saphène externe.</p> <p><i>Parties accessoires.</i>
 a. Muscle droit interne.
 b. Extrémité inférieure du couturier.
 c. Aponévrose postérieure du grand adducteur.</p> | <p>d. Muscle plantaire grêle.
 e. Extrémité supérieure du soléaire.
 f. Courte portion du biceps.
 1. Artère poplitée.
 2. Artère articulaire supérieure interne.
 3, 3. Artères jumelles.
 4. Veine poplitée.
 5. Veine poplitée surnuméraire (anomalie).
 6. Embouchure de la veine saphène externe.
 7. Tronc du grand nerf sciatique.
 8. Nerf sciatique poplité externe.
 9. Nerf sciatique poplité interne.
 10. Branches du nerf sciatique poplité interne destinées aux muscles jumeaux.</p> |
|--|--|

PLANCHE 58.

RÉGION JAMBIÈRE ANTÉRO-EXTERNE.

1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

- A.B. Ligature de l'artère tibiale antérieure. — Incision de 8 centimètres dans la direction d'une ligne qui, du milieu de l'espace compris entre la tête du péroné et l'épine du tibia, irait aboutir au milieu de l'espace intermalléolaire. — Pour plus de sûreté, on divisera l'aponévrose sur le premier interstice musculaire, à partir de la crête du tibia.
- C.D. Ligature de l'artère péronière. — Incision de 8 centimètres, à 3 ou 4 millimètres en arrière du bord externe du péroné.
- E.F.G. Amputation de la jambe au lieu d'élection. — Procédé à un lambeau externe de Sédillot. — E.F. Partie antérieure du lambeau. Celui-ci doit avoir cinq travers de doigt de hauteur; sa base correspond, en avant, à 1 centimètre en dehors de la crête du tibia, et en arrière, au milieu du mollet. — F.G. Incision semi-circulaire, légèrement convexe en bas, menée sur la face interne de la jambe et joignant les deux extrémités de la base du lambeau.
- H.K.L.M. Amputation sus-malléolaire. — Procédé de Lenoir modifié. — H.K. Incision circulaire à 4 centimètres au-dessous du point où l'on veut scier les os. — L.M. Incision verticale de 4 centimètres, à 1 ou 2 centimètres en dehors de la crête du tibia. — Lenoir faisait l'incision verticale sur la face interne du tibia, près de la crête.
- N.O.P. Amputation dans l'articulation tibio-tarsienne. — Procédé de J. Roux. — La première incision part de la partie postérieure et moyenne de la face externe du calcaneum, passe sous la malléole externe, décrit une courbe à convexité antérieure qui descend à 2 ou 3 centimètres en avant de l'article, et s'arrête un peu en avant du bord antérieur de la malléole interne. — Une seconde incision part de ce point, traverse la plante du pied un peu obliquement, en décrivant une légère courbe à convexité antérieure, passe au niveau de l'articulation médio-tarsienne, et remonte obliquement jusqu'au point de départ de la première.
- Q. Point où l'on peut faire la section du nerf sciatique poplité externe. — Ce point est situé immédiatement au-dessous de la tête du péroné.






PLANCHE 59.

RÉGION JAMBIÈRE ANTÉRO-EXTERNE.

2^e Plan.

Préparation. — Menez une incision verticale le long de la crête du tibia, depuis la tubérosité antérieure de cet os jusqu'à la base de la malléole interne. Aux deux extrémités de cette incision, faites-en deux autres, perpendiculaires la première, et dirigées horizontalement en dehors. L'incision supérieure s'arrêtera sur la tête du péroné, l'incision inférieure sur la base de la malléole externe. Disséquez, de dedans en dehors, le grand lambeau quadrilatère et découvrez l'aponévrose jambière, en préparant, au fur et à mesure, les vaisseaux et les nerfs superficiels.

EXPLICATION.

A,A. Coupe de la peau.		2,2. Veines superficielles de la région antéro-externe de la
B,B. Lambeau comprenant la peau et le pannicule adipeux.		jambe.
a,a. Aponévrose jambière.		3,3. Branches superficielles du nerf musculo-cutané.
1,1. Artérioles tégumentaires fournies par l'artère tibiale antérieure.		

PLANCHE 60.

RÉGION JAMBIÈRE ANTÉRO-EXTERNE.

3^e Plan.

Préparation. — Enlevez l'aponévrose d'enveloppe et préparez les muscles superficiels, c'est-à-dire le jambier antérieur, l'extenseur commun et les péroniers latéraux. Dans les deux tiers inférieurs de la région, la préparation est extrêmement facile ; mais dans le tiers supérieur, l'aponévrose adhère si intimement aux fibres musculaires, qu'il est impossible de l'en séparer proprement. Vous commencerez par la soulever en bas, jusqu'à ce que vous soyez arrivé sur la partie adhérente ; alors, vous saisirez à pleine main la portion d'aponévrose disséquée, et vous l'arracherez de bas en haut, par un brusque mouvement de traction.

EXPLICATION.

A, A. Coupe de la peau.

a. Partie inférieure de la face externe du péroné.

b. Muscle jambier antérieur.

c. Muscle extenseur commun des orteils.

d. Muscle péronier antérieur.

e. Muscle extenseur propre du gros orteil.


f. Muscle long péronier latéral.

g. Muscle court péronier latéral.

1. Artère tibiale antérieure.

2. Artère malléolaire externe.

3, 3. Branches cutanées du nerf musculo-cutané.






PLANCHE 61.

RÉGION JAMBIÈRE ANTÉRO-EXTERNE.

4^e Plan.

Préparation. — Coupez, à la partie inférieure de la région, les muscles jambier antérieur, extenseur commun et long péronier latéral, de manière à découvrir complètement toute la portion jambière du court péronier latéral et de l'extenseur propre du gros orteil. Il vous sera ensuite très-facile de préparer l'artère tibiale antérieure, son nerf satellite et le nerf musculo-cutané.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A, A. Coupe de la peau.
- B. Tubérosité antérieure du tibia.
- C. Tête du péroné.
- D. Extrémité inférieure du péroné.
- E. Extrémité supérieure du muscle jambier antérieur.
- F. Tendon du muscle jambier antérieur.
- G. Tendon de l'extenseur commun des orteils.
- H. Tendon du muscle péronier antérieur.
- K. Extrémité supérieure du muscle long péronier latéral.
- L. Tendon du long péronier latéral.
- M. Muscle soléaire.

Parties contenues dans le 4^e plan.

- a. Face externe du tibia.
- b. Face externe du péroné.
- c. Ligament intéroseux.
- d. Muscle extenseur propre du gros orteil.
- e. Muscle court péronier latéral.
- 1. Artère tibiale antérieure.
- 2. Artère malléolaire externe.
- 3. Nerf sciatique poplité externe.
- 4. Nerf tibial antérieur.
- 5. Nerf musculo-cutané.


PLANCHE 62.

RÉGION JAMBIÈRE POSTÉRIEURE.

1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

- A.B. Ligature de l'artère poplitée à sa partie inférieure. — Procédé de Marchal. — Incision de 8 à 10 centimètres le long du bord interne du jumeau interne et en arrière de la patte d'oie. — Évitez le saphène interne. — Ne pas oublier de fléchir la jambe sur la cuisse et de faire reposer le membre sur sa face externe.
- C. Point où l'on doit introduire le ténotome, pour la section du tendon d'Achille ; ce point correspond au milieu de la hauteur de la malléole externe. — Faites pénétrer l'instrument par le côté interne du tendon, pour éviter que son extrémité n'aille blesser l'artère tibiale postérieure ou son nerf satellite. Cette remarque est surtout importante lorsqu'on opère sur de très-jeunes enfants.
- D.E.F. Amputation de la jambe au lieu d'élection. — Procédé à un lambeau externe de Sédillot. — D.E. Partie postérieure du lambeau — E.F. Partie postérieure de l'incision horizontale. (Voy. pl. 58. E.F.G.)






PLANCHE 63.

RÉGION JAMBIÈRE POSTÉRIEURE.

2^e Plan.

Préparation. — Faites une incision verticale médiane, depuis la région poplitée jusqu'au bas du talon ; et faites tomber, sur chacune de ses extrémités, une incision horizontale comprenant la demi-circonférence postérieure du membre. Rabattez les deux lambeaux cutanés de dedans en dehors et découvrez l'aponévrose jambière, en préparant, au fur et à mesure, les vaisseaux et les nerfs superficiels. Vous remarquerez que la veine saphène externe est logée dans l'aponévrose, sur une portion de son étendue ; le nerf saphène externe l'accompagne, mais il est situé en dehors du canal qui loge la veine.

EXPLICATION.

- | | |
|--|--|
| A,A. Coupe de la peau. | 5. Branche cutanée péronière. |
| B,B. Lambeaux comprenant la peau et le pannicule adipeux. | 6. Nerf saphène péronier (racine externe du nerf saphène externe). |
| a,a. Aponévrose jambière. | 7. Nerf saphène tibial (racine interne du nerf saphène externe). |
| 1,1. Artérioles superficielles fournies par la poplitée. | 8,8. Rameaux postérieurs du nerf saphène interne. |
| 2,2. Artérioles fournies par la tibiale postérieure. | |
| 3,3. Veine saphène externe. | |
| 4,4. Veines innominées de la face postérieure de la jambe. | |

PLANCHE 64.

RÉGION JAMBIÈRE POSTÉRIEURE.

3° Plan.

Préparation. — Enlevez d'abord l'aponévrose d'enveloppe ainsi que les vaisseaux et les nerfs superficiels; préparez ensuite, avec soin, les deux muscles jumeaux et le tendon d'Achille. Cela fait, vous enlèverez ce tendon, pour mettre à découvert l'aponévrose profonde, dans le tiers inférieur de la région; tandis que, dans le tiers supérieur, vous enlèverez la portion charnue des deux jumeaux et vous préparerez la face superficielle du soléaire, sur laquelle vous trouverez le tendon du plantaire grêle.

EXPLICATION.


Parties accessoires.

- A, A. Coupe de la peau.
- B. Muscle droit interne.
- C. Tendon du demi-tendineux.

Parties contenues dans le 3° plan.

- a, a. Muscle jumeau interne.
- b, b. Muscle jumeau externe.
- c. Extrémité supérieure du tendon d'Achille.

- d. Extrémité inférieure du tendon d'Achille.
- e. Bourse séreuse séparant le tendon d'Achille du calcaneum.
- f. Tendon du plantaire grêle.
- g. Muscle poplité.
- h. Muscle soléaire.
- k. Aponévrose profonde.
- 1. Vaisseaux tibiaux postérieurs vus par transparence, à travers l'aponévrose profonde.






PLANCHE 65.

RÉGION JAMBIÈRE POSTÉRIEURE.

4^e Plan.

Préparation. — Enlevez les muscles de la couche superficielle, en conservant, toutefois, les attaches supérieures du soléaire. Mettez à découvert la couche profonde par l'ablation de l'aponévrose sous-jacente au soléaire, et disséquez les muscles, vaisseaux et nerfs qui se présenteront à vous, ce qui se fera sans aucune difficulté. Vous n'oublierez pas de préparer, en même temps, l'extrémité inférieure du creux poplité, pour bien voir le passage de l'artère poplitée et du nerf sciatique poplité interne sous l'arcade fibreuse du soléaire.

EXPLICATION.

Parties accessoires.

- A,A. Coupe de la peau.
- B. Coupe du couturier.
- C. Coupe du droit interne.
- D. Coupe du demi-tendineux.
- E. Tendon du demi-membraneux.
- F. Coupe du jumeau interne.
- G. Coupe du jumeau externe.
- H. Tendon du biceps crural.
- K. Extrémité supérieure du soléaire.
- L. Extrémité inférieure du tendon d'Achille.
- M. Muscle long péronier latéral.
- N. Muscle court péronier latéral.

- O,O. Artères articulaires inférieures.
- P. Nerf sciatique poplité externe.

Parties contenues dans le 4^e plan.

- a. Face postérieure du péroné.
- b. Muscle poplité.
- c. Muscle long fléchisseur commun des orteils.
- d. Muscle long fléchisseur propre du gros orteil.
- e. Tendon du jambier postérieur.
- 1. Artère poplitée.
- 2. Artère tibiale postérieure.
- 3,3. Artère péronière.
- 4. Nerf sciatique poplité interne.
- 5. Nerf tibial postérieur.

PLANCHE 66.

COUPES DE LA JAMBE.

FIG. 1. — Coupe transversale au lieu d'élection.

EXPLICATION.

A,A. Coupe de la peau.

B. Corps du tibia.

C. Corps du péroné.

a. Ligament interosseux.

b,b. Aponévrose d'enveloppe.

c. Muscle jambier antérieur.

d. Extenseur commun des orteils.

e. Long péronier latéral.

f. Jumeau interne.

g. Jumeau externe.

h. Soléaire.

k. Fléchisseur commun des orteils.

l. Jambier postérieur.

1. Artère tibiale antérieure.

2. Artère tibiale postérieure.

3. Artère péronière.

4. Veine saphène interne.

5. Veine saphène externe.

6,6. Veines superficielles de la face postérieure de la jambe.

7. Nerf tibial antérieur.

8. Nerf tibial postérieur.

FIG. 2. — Coupe transversale au milieu de la jambe.

EXPLICATION.

A,A. Coupe de la peau.

B. Corps du tibia.

C. Corps du péroné.

a. Ligament interosseux.

b,b. Aponévrose d'enveloppe.

c. Muscle jambier antérieur.

d. Extenseur commun des orteils.

e. Extenseur propre du gros orteil.

f. Long péronier latéral.

g. Court péronier latéral.

h. Jumeau interne.

k. Jumeau externe.

l. Soléaire.

m. Fléchisseur commun des orteils.

n. Fléchisseur propre du gros orteil.

o. Jambier postérieur.

1. Artère tibiale antérieure.

2. Artère tibiale postérieure.

3. Artère péronière.

4. Veine saphène interne.

5. Veine saphène externe.

6. Nerf tibial antérieur.

7. Nerf tibial postérieur.

FIG. 3. — Coupe transversale au tiers inférieur de la jambe.

EXPLICATION.

A,A. Coupe de la peau.

B. Corps du tibia.

C. Corps du péroné.

a. Ligament interosseux.

b,b. Aponévrose d'enveloppe.

c. Muscle jambier antérieur.

d. Extenseur commun des orteils.

e. Péronier antérieur.

f. Extenseur propre du gros orteil.

g. Tendon du long péronier latéral.

h. Muscle court péronier latéral.

k. Tendon d'Achille.

l. Fléchisseur commun des orteils.

m. Fléchisseur propre du gros orteil.

n. Tendon du jambier postérieur.

1. Artère tibiale antérieure.

2. Artère tibiale postérieure.

3,3. Origines de la veine saphène interne.

4,4. Origines de la veine saphène externe.

5. Nerf tibial antérieur.

6. Nerf tibial postérieur.


Fig. 1.



Fig. 3



Fig. 2







PLANCHE 67.

RÉGION INTERNE DU COU-DE-PIED.

FIG. 1. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

A.B. Ligature de l'artère tibiale postérieure derrière la malléole interne. — Incision verticale de 5 centimètres au milieu de l'espace compris entre la malléole et le tendon d'Achille.

C. Point où l'on peut saigner la saphène interne, immédiatement en avant de la malléole.

D.E.F. Amputation dans l'articulation tibio-tarsienne. — Procédé de Syme. — D.E. Incision courbe à convexité inférieure, dont les deux extrémités aboutissent un peu au-dessous de la pointe des malléoles, et dont la convexité passe à 2 ou 3 millimètres en avant de la tête de l'astragale. — D.F. Incision verticale figurant un sous-pied dont les deux extrémités se rattachent aux extrémités de l'incision précédente, et dont la partie moyenne s'avance, à la plante du pied, jusqu'au niveau de l'articulation médio-tarsienne.

FIG. 2. — 2^e Plan.

Préparation.— Délimitez la région par deux incisions transversales menées : l'une à 2 centimètres au-dessus de la base de la malléole, l'autre à 3 centimètres au-dessous de l'interligne articulaire tibio-tarsien. Détachez ensuite la peau dans cet espace, depuis le milieu de la face dorsale jusqu'au tendon d'Achille, et découvrez l'aponévrose d'enveloppe, en préparant les vaisseaux et les nerfs superficiels. L'absence d'un fascia superficialis bien distinct et l'adhérence du tégument, sur certains points, rendront la dissection un peu difficile.

EXPLICATION.

A, A. Coupe de la peau.

B. Tissu conjonctif adipeux de la région plantaire.

C. Malléole interne.

a. Aponévrose jambière.

b. Aponévrose dorsale du pied.

c. Ligament annulaire interne du tarse.

d. Gaine du jambier antérieur.

e. Gaine du tendon d'Achille.

f. Aponévrose plantaire interne.

1, 1. Artérioles superficielles fournies par la malléolaire interne.

2, 2. Branches d'origine de la veine saphène interne.

3. Veine saphène interne.

4, 4. Veines superficielles se rendant aux deux veines saphènes.

5, 5. Veines communicantes.

6, 6. Rameaux du nerf saphène interne.

PLANCHE 68.

RÉGIONS INTERNE ET EXTERNE DU COU-DE-PIED.

FIG. 1. — RÉGION INTERNE.

3^e Plan.

Préparation. — Enlevez l'aponévrose d'enveloppe et préparez les tendons qui se présenteront; cette préparation n'offrira pas la moindre difficulté.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	<i>Parties contenues dans le 3^e plan.</i>
A, A. Coupe de la peau.	a. Tendon du jambier antérieur.
B. Tissu adipeux de la région plantaire.	b. Tendon du jambier postérieur.
C. Aponévrose plantaire interne.	c. Tendon du fléchisseur commun des orteils.
D. Malléole interne.	d. Tendon d'Achille.
	1. Artère tibiale postérieure.
	2. Artère malléolaire interne.
	3. Nerf tibial postérieur.

FIG. 2. — RÉGION EXTERNE.

1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

- A. Point où l'on peut saigner la saphène externe, immédiatement en arrière de la malléole.
- B.C.D. Amputation sous-astragaliennne. — Procédé de Vernueil. — L'incision a son point de départ sur la face externe du calcanéum, immédiatement en dehors du point où le tendon d'Achille vient se confondre avec cet os; elle passe à 2 ou 3 centimètres au-dessous de la malléole péronière, sur la tubérosité externe du calcanéum, puis à 2 centimètres en arrière et en dedans de l'extrémité postérieure du cinquième métatarsien. Elle décrit ensuite, sur le dos du pied, une courbe dont la convexité, tournée en bas, passe à 2 centimètres au-dessous de la tête de l'astragale. Elle atteint le bord interne du pied au niveau de la partie moyenne du premier cunéiforme. Enfin, elle traverse la plante du pied d'avant en arrière et de dedans en dehors, depuis le premier cunéiforme jusqu'à la face externe du calcanéum, où elle rejoint son point de départ.
- E.F.G.H. Amputation simultanée du quatrième et du cinquième métatarsiens. — Procédé en raquette modifié. — La queue de la raquette, au lieu d'être rectiligne comme à l'ordinaire, décrit une courbe à convexité supérieure dont l'extrémité postérieure E aboutit sur le bord externe du pied, immédiatement en arrière du cinquième métatarsien, et dont l'extrémité antérieure se termine au niveau du tiers antérieur du quatrième espace interosseux. De ce point F on décrit un ovale embrassant les deux orteils à enlever. La branche F.G de cet ovale n'est autre chose que le prolongement de E.F jusque dans le troisième espace interdigital. La courbe E.F.H forme un lambeau externe que l'on rabat en dehors, ce qui facilite beaucoup la manœuvre opératoire.





Fig. 1




Fig. 2.




PLANCHE 69.

RÉGION EXTERNE DU COU-DE-PIED.

FIG. 1. — 2^e Plan.

Préparation. — Procédez, pour cette préparation, identiquement comme vous l'avez fait sur la face interne, en prenant les mêmes limites et en enlevant les mêmes tissus. Vous trouverez quelquefois une bourse séreuse sous-cutanée sur la malléole externe.

EXPLICATION.

A,A. Coupe de la peau.	1,1. Artérioles superficielles fournies par la malléolaire externe.
B. Tissu conjonctif adipeux de la région plantaire.	2,2. Branches d'origine de la veine saphène externe.
C. Malléole externe.	3. Veine saphène externe.
a. Aponévrose jambière.	4,4. Veines superficielles se rendant aux deux veines saphènes.
b. Aponévrose dorsale du pied.	5. Branche cutanée externe du nerf musculo-cutané.
c. Ligament annulaire antérieur du tarse.	6,6. Rameaux du nerf saphène externe.
d. Ligament annulaire externe du tarse.	
e. Aponévrose plantaire externe.	
f. Gaine du tendon d'Achille.	

FIG. 2. — 3^e Plan.

Préparation. — Enlevez l'aponévrose d'enveloppe, soit en totalité, soit en conservant les ligaments annulaires, et préparez les muscles sous-jacents.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	<i>Parties contenues dans le 3^e plan.</i>
A,A. Coupe de la peau.	a,a. Tendons du muscle extenseur commun des orteils.
B. Tissu adipeux de la région plantaire.	b,b. Muscle péronier antérieur.
C. Malléole externe.	c. Extrémité postérieure du pédieux.
D. Ligament annulaire antérieur du tarse.	d,d. Long péronier latéral.
E. Ligament annulaire externe du tarse.	e,e. Court péronier latéral.
F. Aponévrose plantaire externe.	f. Tendon d'Achille.
	1,1. Branches de l'artère malléolaire externe.
	2. Rameau postérieur de l'artère péronière.

PLANCHE 70.

RÉGION DORSALE DU PIED.

Fig. 1. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.



- A.B. Ligature de l'artère pétiense. — Incision de 5 centimètres sur le trajet d'une ligne menée du milieu de l'espace intermalléolaire à la partie postérieure du premier espace interosseux.
- C.D. Désarticulation médio-tarsienne. — Amputation de Chopart. — Incision dorsale dont la convexité descend à 15 millimètres en avant de l'articule. — L'extrémité interne de cette incision aboutit en arrière de la tubérosité du scaphoïde, l'extrémité externe à 12 millimètres en arrière du cinquième métatarsien.
- E.F. Désarticulation tarso-métatarsienne. — Amputation de Lisfranc. — Incision dorsale dont la convexité descend à 15 millimètres en avant de l'articule. — L'extrémité interne de cette incision aboutit en arrière du tubercule du premier métatarsien, l'extrémité externe immédiatement en arrière du cinquième métatarsien.
- G.H.K.L.M. Amputation du premier métatarsien. — Méthode ovulaire modifiée. — G.H.K.L. Incision en raquette dont la pointe correspond à la face dorsale de l'articule. — G.M. Incision menée un peu obliquement de haut en bas et d'avant en arrière, depuis la pointe de la raquette jusqu'au bord interne de la plante du pied.
- N.O.P.Q. Amputation d'un orteil. — Procédé en raquette.

Fig. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Faites une incision transversale, un peu au-dessus de la base des malléoles. Menez ensuite une incision médiane sur toute la face dorsale du pied, jusqu'à la racine des orteils et rabattez, de chaque côté, les deux lambeaux cutanés. Vous conserverez les veines et les nerfs superficiels, et vous préparerez l'aponévrose dorsale.


EXPLICATION.

A.A. Coupe de la peau.	1. Artériole fournie par la malléolaire externe.
B.B. Lambeaux comprenant la peau et la couche sous-cutanée.	2, 2. Veines dorsales du pied.
a. Aponévrose jambière.	3, 3. Branches d'origine de la veine saphène interne.
b. Ligament annulaire antérieur du tarse.	4, 4. Branches d'origine de la veine saphène externe.
c. Aponévrose dorsale du pied.	5. Nerf saphène interne.
d. Tendon du jambier antérieur.	6, 6. Nerf musculo-cutané.
e. Tendon de l'extenseur propre du gros orteil.	7. Nerf saphène externe.
f. Premier tendon du pétiens.	
g, g. Tendons de l'extenseur commun des orteils.	





2017



100




PLANCHE 71.

RÉGION DORSALE DU PIED.

FIG. 1. — 3° Plan.

Préparation. — Enlevez l'aponévrose d'enveloppe, mais en conservant le ligament annulaire antérieur du tarse. Préparez ensuite les tendons du jambier antérieur et des extenseurs, et poursuivez ces derniers jusqu'à l'extrémité des deux premiers orteils, pour voir la façon différente dont ils s'y terminent. Vous pourrez mettre à découvert le corps charnu du pédieux, mais vous aurez soin de laisser en place la lame aponévrotique qui se détache de la gaine de ce muscle et recouvre l'artère pédieuse.

EXPLICATION.

- | | |
|---|--|
| A. A. Coupe de la peau. | B. Quatrième tendon du pédieux. |
| a. a. Ligament annulaire antérieur du tarse. | 1. Artère tibiale antérieure. |
| b. b. Muscle jambier antérieur. | 2. Artère pédieuse vue par transparence à travers l'aponévrose profonde. |
| c. c. Muscle extenseur propre du gros orteil. | 3, 3. Artères interosseuses dorsales. |
| d. Muscle péronier antérieur. | 4. Nerf tibial antérieur. |
| e. Premier faisceau du pédieux. | 5. Rameau profond interne du dos du pied. |
| f. Second tendon du pédieux. | |
| g. Troisième tendon du pédieux. | |

FIG. 2. — 4° Plan.

Préparation. — Coupez transversalement, au niveau des malléoles, le jambier antérieur et les deux extenseurs; renversez les de haut en bas, en incisant la gaine que leur forme le ligament annulaire, et coupez-les près de leur extrémité inférieure. Enlevez de même le pédieux. Enfin, préparez les ramifications de l'artère pédieuse et les deux nerfs profonds dorsaux émanés du tibial antérieur.

EXPLICATION.

- | <i>Parties accessoires.</i> | | <i>c. Gaine de l'extenseur commun des orteils et du péronier antérieur.</i> |
|--|--|---|
| A. A. Coupe de la peau. | | d, d. Muscles interosseux dorsaux. |
| B. Coupe du muscle jambier antérieur. | | 1. Artère tibiale antérieure. |
| C. Coupe de l'extenseur propre du gros orteil. | | 2. Artère péronière antérieure. |
| D. Coupe de l'extenseur commun des orteils et du péronier antérieur. | | 3. Artère pédieuse. |
| E. E. Tendons des extenseurs. | | 4. Artère tarsienne interne. |
| F. F. Tendons du pédieux. | | 5, 5. Artères tarsiennes externes (dorsale du tarse). |
| G. Tendon du péronier antérieur. | | 6. Artère métatarsienne interne. |
| H. Tendon du court péronier latéral. | | 7. Artère métatarsienne externe (dorsale du métatarse). |
| K. Extrémité postérieure du pédieux. | | 8, 8. Artères interosseuses dorsales. |
| <i>Parties contenues dans le 4° plan.</i> | | 9. Nerf tibial antérieur. |
| a. Gaine du jambier antérieur. | | 10. Rameau profond externe du dos du pied. |
| b. Gaine de l'extenseur propre du gros orteil, | | 11. Rameau profond interne du dos du pied. |

PLANCHE 72.

RÉGION DORSALE DU PIED.

FIG. 1. — 5° Plan.

Préparation. — Enlevez l'extrémité postérieure du pédieux, les vaisseaux et le reste du ligament annulaire antérieur. La préparation sera pour ainsi dire achevée, et il ne vous restera plus qu'à froter les ligaments avec un linge rude, pour les rendre bien apparents.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	<i>Parties contenues dans le 5° plan.</i>
A, A. Coupe de la peau.	a. Ligament péronéo-tibial antérieur.
B. Coupe des muscles de la face antérieure de la jambe.	b. Ligament antérieur de l'articulation tibio-tarsienne.
C. Tendon du jambier antérieur.	c. Faisceau antérieur (tibio-astragalien) du ligament latéral interne.
D. Tendon du court péronier latéral.	d. Ligament astragalo-scaphoïdien supérieur.
E. Tendon du long péronier latéral.	e. Ligament calcaneo-cuboïdien supérieur.
F. Premier métatarsien.	f. Ligament astragalo-cuboïdien.
G. Second métatarsien.	g, g. Ligaments dorsaux de la seconde rangée du tarse.
H. Troisième métatarsien.	h, h. Ligaments tarso-métatarsiens dorsaux.
K. Quatrième métatarsien.	k, k. Ligaments intermétatarsiens dorsaux.
L. Cinquième métatarsien.	
M. Premier interosseux dorsal.	
N. Second interosseux dorsal.	
O. Troisième interosseux dorsal.	
P. Quatrième interosseux dorsal.	

FIG. 2. — 6° Plan.

EXPLICATION.

a. Extrémité inférieure du tibia.	o. Second métatarsien.
b. Malleole interne.	p. Troisième métatarsien.
c. Extrémité inférieure du péroné.	q. Quatrième métatarsien.
d. Malleole externe.	r. Cinquième métatarsien.
e. Astragale.	s. Première phalange du gros orteil.
f. Grande apophyse du calcaneum.	t, t. Première phalange des quatre derniers orteils.
g. Scaphoïde.	u, u. Seconde phalange des quatre derniers orteils.
h. Cuboïde.	v. Phalange unguéale du gros orteil.
i. Premier cunéiforme.	x, x. Phalange unguéale des quatre derniers orteils.
l. Second cunéiforme.	
m. Troisième cunéiforme.	
n. Premier métatarsien.	





Fig. 2




Fig. 1




PLANCHE 73.

RÉGION PLANTAIRE.

Fig. 1. — 1^{er} Plan.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

A.B. Incision marquant la limite antérieure du lambeau plantaire dans la désarticulation larso-métatarsienne. Elle passe, en dedans, au niveau des os sésamoïdes, et en dehors, entre le tiers antérieur et le tiers moyen du cinquième métatarsien. (Voyez, pour l'incision dorsale, pl. 70, fig. 4—E.F.)

C.D. Incision marquant la limite antérieure du lambeau plantaire dans la désarticulation médio-tarsienne. Elle passe, en dedans, sous la tête du premier métatarsien, et en dehors, à la partie moyenne du cinquième métatarsien. (Voyez, pour l'incision dorsale, pl. 70, fig. 4—C,D.)

E.F. Trajet de l'incision plantaire dans l'amputation sous-astragalienne par le procédé de Verneuil. — Depuis le premier cunéiforme jusqu'à la face externe du calcanéum, au point de départ de l'incision dorsale. (Voy. pl. 68, fig. 2—B,C,D.)

Fig. 2. — 2^e Plan.

Préparation. — Faites une première incision semi-circulaire, en suivant le bord inférieur du talon. Coupez ensuite la peau transversalement, au niveau de la racine

des orteils, d'un bord du pied à l'autre. Joignez ces deux incisions transversales par une incision longitudinale médiane très-profonde, car elle doit s'étendre jusqu'à l'aponévrose plantaire et traverser une épaisse couche de tissu adipeux. Une fois cette aponévrose reconnue, vous la préparerez, en renversant en dehors les deux lambeaux cutanés, et en conservant les branches vasculaires et nerveuses destinées à la peau. L'aponévrose plantaire est unie à la face profonde du pannicule adipeux par une foule de prolongements que vous devrez nécessairement détruire. En terminant la préparation, il sera bon d'enlever le tégument sur l'un quelconque des orteils, pour mettre à nu la gaine des tendons fléchisseurs.

EXPLICATION.

A, A. Coupe de la peau.	e. Aponévrose plantaire interne.
B, B. Lambeaux comprenant la peau et le pannicule adipeux.	f. Aponévrose plantaire externe.
C. Face inférieure du calcanéum.	1. Artère calcaneenne interne.
a. Aponévrose plantaire moyenne.	2. Artère calcaneenne externe.
b, b. Prolongements que cette aponévrose fournit à la face profonde du tégument.	3, 3. Artérioles fournies par la plantaire externe.
c, c. Arcades de l'aponévrose plantaire moyenne.	4, 4. Artérioles fournies par la plantaire interne.
d. Gaine des tendons fléchisseurs du second orteil.	5, 5. Rameaux cutanés du nerf plantaire interne.
	6, 6. Rameaux cutanés du nerf plantaire externe.

PLANCHE 74.

RÉGION PLANTAIRE.

Fig. 1. — 3^e Plan.

Préparation. — Vous enlèverez sans difficultés les aponevroses plantaires interne et externe. Quant à l'aponévrose plantaire moyenne, elle est tellement adhérente au muscle court fléchisseur, dans son tiers postérieur, qu'il est impossible de l'en détacher. Vous vous contenteriez de l'enlever dans les deux tiers antérieurs de la région. La dissection qui reste à faire demande du temps et de la patience ; elle consiste à isoler les tendons, les vaisseaux et les nerfs du premier plan sous-aponévrotique, au milieu d'un tissu conjonctif adipeux parfois très-abondant. Vous poursuivrez les tendons fléchisseurs jusqu'à l'extrémité des deux premiers orteils.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	
A, A. Coupe de la peau.	
B. Tubérosités du calcaneum.	
C. Aponévrose plantaire interne.	
D. Aponévrose plantaire moyenne.	
<i>Parties contenues dans le 3^e plan.</i>	
a. Muscle adducteur du gros orteil.	1. Tendon du long fléchisseur propre du gros orteil.
b. Muscle abducteur du petit orteil.	2. Artère calcanéenne interne.
c. Muscle court fléchisseur commun des orteils.	3. Artère calcanéenne externe.
	4. Artère plantaire interne.
	5. Artère plantaire externe.
	6, 6. Arcade plantaire superficielle.
	7, 7. Rameaux du nerf plantaire interne.
	8, 8. Rameaux du nerf plantaire externe.

Fig. 2. — 4^e Plan.

Préparation. — Si la préparation du plan précédent a été nettement faite, celle-ci s'exécutera aisément. Coupez transversalement le court fléchisseur à une petite distance de son extrémité postérieure, rabattez-le d'arrière en avant, et enlevez-le, après avoir sectionné ses tendons terminaux au niveau de la tête des métatarsiens.

EXPLICATION.

<i>Parties accessoires.</i>	
A, A. Coupe de la peau.	
B. Tubérosités du calcaneum.	
C. Coupe du muscle court fléchisseur commun des orteils.	
D, D. Tendons du court fléchisseur commun des orteils.	
E. Muscle adducteur du gros orteil.	
F. Muscle abducteur du petit orteil.	
<i>Parties contenues dans le 4^e plan.</i>	
a. Muscle court fléchisseur du gros orteil.	b. Muscle court fléchisseur du petit orteil.
	c. Tendon du long fléchisseur propre du gros orteil.
	d, d. Tendon du long fléchisseur commun des orteils.
	e. Accessoire du long fléchisseur commun.
	f, f. Lombrireaux.
	1. Artère calcanéenne interne.
	2. Artère calcanéenne externe.
	3. Artère plantaire interne.
	4. Artère plantaire externe.
	5, 5. Rameaux du nerf plantaire interne.
	6, 6. Rameaux du nerf plantaire externe.





Fig. 2




Fig. 1




PLANCHE 75.

RÉGION PLANTAIRE.

Fig. 1. — 5^e Plan.

Préparation. — Enlevez complètement l'adducteur du gros orteil, le fléchisseur propre, le fléchisseur commun et son accessoire, les lombrireaux et l'abducteur du petit orteil. Vous aurez sous les yeux un plan composé de deux portions distinctes, une portion postérieure tarsienne, et une portion antérieure métatarsienne. Dans la portion tarsienne, vous préparerez les ligaments qui unissent les os entre eux, ainsi que la gaine ostéo-fibreuse du long péronier latéral. Dans la portion métatarsienne, vous isolerez les muscles court fléchisseur, abducteur oblique et abducteur transverse du gros orteil, court fléchisseur du petit orteil et les interosseux plantaires. Conserved les branches profondes de l'artère et du nerf plantaires externes.

EXPLICATION.

A. Coupe de la peau.	m. Ligament calcaneo-éuboïdien interne.
a. Muscle court fléchisseur du gros orteil.	n. Ligament calcaneo-scaphoïdien inférieur.
b. Faisceau interne de l'abducteur oblique du gros orteil.	o. Expansion du tendon du jumbier postérieur, allant du scaphoïde au premier cunéiforme.
c. Faisceau externe de l'abducteur oblique.	p. Expansion oblique du tendon du jumbier postérieur, allant au troisième cunéiforme, au troisième métatarsien et au cuboïde.
d. Abducteur transverse du gros orteil.	1. Bifurcation de l'artère fibiale postérieure.
e. Court fléchisseur du petit orteil.	2. Extrémité antérieure de l'artère plantaire interne.
f. Muscles interosseux plantaires.	3. Branche profonde de l'artère plantaire externe.
g, g. Couliesses des tendons fléchisseurs des orteils.	
h. Tendon du long péronier latéral.	
k. Ligament calcaneo-éuboïdien inférieur.	
l. Fibres superficielles de ce ligament formant la couliasse du long péronier latéral.	

Fig. 2. — 6^e Plan.

EXPLICATION.

a. Calcaneum.	n. Second métatarsien.
b. Tubérosité du calcaneum.	o. Troisième métatarsien.
c. Petite apophyse du calcaneum.	p. Quatrième métatarsien.
d. Grande apophyse du calcaneum.	q. Cinquième métatarsien.
e. Face inférieure de la tête de l'astragale.	r. Première phalange du gros orteil.
f. Scaphoïde.	s, s. Première phalange des quatre derniers orteils.
g. Cuboïde.	t, t. Seconde phalange des quatre derniers orteils.
h. Premier cunéiforme.	u. Phalange unguéale du gros orteil.
k. Second cunéiforme.	v, v. Phalange unguéale des quatre derniers orteils.
l. Troisième cunéiforme.	
m. Premier métatarsien.	

PLANCHE 76.

COUPES DU PIED.

Fig. 1. — Coupe horizontale passant par le milieu de la malléole

externe.

EXPLICATION.

A.A. Coupe de la peau.	Jf. Court péronier latéral,
B. Extrémité inférieure du tibia.	g. Jambier postérieur.
C. Malléole externe.	h. Fléchisseur commun des orteils.
a. Jambier antérieur.	i. Fléchisseur propre du gros orteil.
b. Extenseur propre du gros orteil.	1. Artère tibiale antérieure.
c. Extenseur commun des orteils et péronier antérieur.	2. Artère tibiale postérieure.
d. Tendon d'Achille.	3. Nef tibiai postérieur.
e. Long péronier latéral.	4, d. Veines superficielles.

Fig. 2. — Coupe transversale au niveau de la tête de l'astragale.

EXPLICATION.

A.A. Coupe de la peau.	g. Adducteur du gros orteil.
B. Tête de l'astragale.	h. Court fléchisseur commun des orteils.
C. Scaphoïde.	k. Accessoire du long fléchisseur commun des orteils.
D. Cuboïde.	l. Fléchisseur propre du gros orteil.
a. Jambier antérieur.	m. Abducteur du petit orteil.
b. Extenseur propre du gros orteil.	1. Artère pédieuse.
c, c. Extenseur commun des orteils.	2. Artère plantaire externe.
d. Pédieux.	3. Artère plantaire interne.
e. Court péronier latéral.	
f. Long péronier latéral.	

Fig. 3. — Coupe transversale menée du premier cunéiforme à l'extrémité postérieure du cinquième métatarsien.

EXPLICATION.

A.A. Coupe de la peau.	e. Adducteur du gros orteil.
B. Premier cunéiforme.	f. Court fléchisseur du gros orteil.
C. Second cunéiforme.	g. Long fléchisseur du gros orteil.
D. Troisième cunéiforme.	h. Abducteur du petit orteil.
E. Cuboïde.	i. Court fléchisseur commun des orteils.
F. Extrémité postérieure du cinquième métatarsien.	l. Accessoire du long fléchisseur.
a, d. Tendons de l'extenseur commun.	m. Long péronier latéral.
b. Pédieux.	1. Artère pédieuse.
c. Extenseur propre du gros orteil.	2. Artère plantaire externe.
d. Jambier antérieur.	3. Nef plantaire externe.

Fig. 4. — Coupe transversale au milieu du métatars.

EXPLICATION.

A.A. Coupe de la peau.	e. Adducteur du gros orteil.
B. Premier métatarsien.	d. Court fléchisseur du gros orteil.
C. Second métatarsien.	e. Abducteur oblique.
D. Troisième métatarsien.	f. Abducteur du petit orteil.
E. Quatrième métatarsien.	g. Court fléchisseur du petit orteil.
F. Cinquième métatarsien.	h, h. Intersosseux dorsaux.
a, d. Tendons des extenseurs et du pédieux.	k, k. Intersosseux plantaires.
b, b. Tendons des fléchisseurs.	





TABLE DES PLANCHES

CONTENUES DANS LE SECOND VOLUME.

PLANCHE 1. — Région sous-claviculaire.

FIG. 1. — 1^{er} plan ; médecine opératoire.

FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 2. — Régions sous-claviculaire et scapulaire.

FIG. 1. — Région sous-claviculaire. — 3^e plan.

FIG. 2. — Région scapulaire. — 1^{er} plan ; médecine opératoire.

PLANCHE 3. — Région scapulaire.

FIG. 1. — 2^e plan.

FIG. 2. — 3^e plan.

PLANCHE 4. — Région scapulaire.

FIG. 1. — 4^e plan.

FIG. 2. — Plan profond (fosse sous-scapulaire).

PLANCHE 5. — Région du moignon de l'épaule.

FIG. 1. — 1^{er} plan ; médecine opératoire.

FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 6. — Région du moignon de l'épaule.

FIG. 1. — 3^e plan.

FIG. 2. — 4^e plan.

PLANCHE 7. — Région axillaire.

FIG. 1. — 1^{er} plan ; médecine opératoire.

FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 8. — Région axillaire.

FIG. 1. — 3^e plan.

FIG. 2. — 4^e plan.

PLANCHE 9. — Région axillaire.

FIG. 1. — 5^e plan (le bras est relevé).

FIG. 2. — 5^e plan (le bras est abaissé).

PLANCHE 10. — Région brachiale antérieure.

FIG. 1. — 1^{er} plan ; médecine opératoire.

FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 11. — Région brachiale antérieure.

FIG. 1. — 3^e plan.

FIG. 2. — 4^e plan.

PLANCHE 12. — Région brachiale postérieure.

FIG. 1. — 1^{er} plan.

FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 13. — Région brachiale postérieure.

FIG. 1. — 3^e plan.

FIG. 2. — 4^e plan.

PLANCHE 14. — Coupes du bras.

- FIG. 1. — Coupe transversale au niveau de la partie inférieure de l'aisselle.
FIG. 2. — Coupe transversale immédiatement au-dessous du tendon du grand pectoral.
FIG. 3. — Coupe transversale à la partie moyenne du bras.
FIG. 4. — Coupe du bras à sa partie inférieure.

PLANCHE 15. — Région du pli du coude.

- FIG. 1. — 1^{er} plan ; médecine opératoire.
FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 16. — Région du pli du coude.

- FIG. 1. — 3^e plan.
FIG. 2. — 4^e plan.

PLANCHE 17. — Région du pli du coude.

- FIG. 1. — 5^e plan.
FIG. 2. — 6^e plan.

PLANCHE 18. — Région olécrânienne.

- FIG. 1. — 1^{er} plan ; médecine opératoire.
FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 19. — Région olécrânienne.

- FIG. 1. — 3^e plan.
FIG. 2. — 4^e plan.

PLANCHE 20. — Région antibrachiale antérieure ; 1^{er} plan ; médecine opératoire.

PLANCHE 21. — — — — 2^e plan.

PLANCHE 22. — — — — 3^e plan.

PLANCHE 23. — — — — 4^e plan.

PLANCHE 24. — — — — 5^e plan.

PLANCHE 25. — Région antibrachiale postérieure ; 1^{er} plan ; médecine opératoire.

PLANCHE 26. — — — — 2^e plan.

PLANCHE 27. — — — — 3^e plan.

PLANCHE 28. — — — — 4^e plan.

PLANCHE 29. — Coupes de l'avant-bras.

- FIG. 1. — Coupe transversale de l'avant-bras sur la limite du coude.
FIG. 2. — Coupe transversale au tiers supérieur de l'avant-bras.
FIG. 3. — Coupe transversale au tiers moyen de l'avant-bras.
FIG. 4. — Coupe transversale au tiers inférieur de l'avant-bras.

PLANCHE 30. — Région palmaire.

- FIG. 1. — 1^{er} plan ; médecine opératoire.
FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 31. — Région palmaire.

- FIG. 1. — 3^e plan.
FIG. 2. — 4^e plan.

PLANCHE 32. — Région palmaire.

- FIG. 1. — 5^e plan.
FIG. 2. — 6^e plan.

PLANCHE 33. — Région dorsale du poignet et de la main.

- FIG. 1. — 1^{er} plan ; médecine opératoire.
FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 34. — Région dorsale du poignet et de la main.

FIG. 1. — 3^e plan.

FIG. 2. — 4^e plan.

PLANCHE 35. — Coupes du poignet et de la main.

FIG. 1. — Coupe transversale dans l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras, immédiatement au-dessus de l'articulation radio-carpienne.

FIG. 2. — Coupe transversale dans la première rangée des os du carpe.

FIG. 3. — Coupe transversale dans la seconde rangée des os du carpe.

FIG. 4. — Coupe transversale au milieu du métacarpe.

PLANCHE 36. — Région de l'aîne (face antérieure); 1^{er} et 2^e plans; médecine opératoire.

PLANCHE 37. — Région de l'aîne (face antérieure); 3^e et 4^e plans.

PLANCHE 38. — — — — — 5^e et 6^e plans.

PLANCHE 39. — — — — — (face postérieure); 1^{er} et 2^e plans.

PLANCHE 40. — — — — — 3^e et 4^e plans.

PLANCHE 41. — Région fessière; 1^{er} et 2^e plans; médecine opératoire.

PLANCHE 42. — — — — — 3^e et 4^e plans.

PLANCHE 43. — Articulation de la hanche.

FIG. 1. — Face antérieure.

FIG. 2. — Face postérieure.

PLANCHE 44. — Région fémorale antérieure; 1^{er} plan; médecine opératoire.

PLANCHE 45. — — — — — 2^e plan.

PLANCHE 46. — — — — — 3^e plan.

PLANCHE 47. — — — — — 4^e plan (côté externe).

PLANCHE 48. — — — — — 4^e plan (côté interne).

PLANCHE 49. — Région fémorale postérieure; 1^{er} plan; médecine opératoire.

PLANCHE 50. — — — — — 2^e plan.

PLANCHE 51. — — — — — 3^e plan.

PLANCHE 52. — — — — — 4^e plan.

PLANCHE 53. — Coupes de la cuisse.

FIG. 1. — Coupe transversale immédiatement au-dessous de la base du grand trochanter.

FIG. 2. — Coupe transversale à la partie moyenne de la cuisse.

FIG. 3. — Coupe transversale au tiers inférieur de la cuisse.

PLANCHE 54. — Région fémoro-tibiale antérieure.

FIG. 1. — 1^{er} plan; médecine opératoire.

FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 55. — Région fémoro-tibiale antérieure.

FIG. 1. — 3^e plan.

FIG. 2. — Articulation du genou.

PLANCHE 56. — Région fémoro-tibiale postérieure (creux poplité).

FIG. 1. — 1^{er} plan; médecine opératoire.

FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 57. — Région fémoro-tibiale postérieure (creux poplité).

FIG. 1. — 3^e plan.

FIG. 2. — 4^e plan.

PLANCHE 58. — Région jambière antéro-externe; 1^{er} plan; médecine opératoire.

PLANCHE 59. — — — — — 2^e plan.

PLANCHE 60. — — — — — 3^e plan.

PLANCHE 61. — Région jambière antéro-externe; 4^e plan.

PLANCHE 62. — Région jambière postérieure; 1^{er} plan; médecine opératoire.

PLANCHE 63. — — — — 2^e plan.

PLANCHE 64. — — — — 3^e plan.

PLANCHE 65. — — — — 4^e plan.

PLANCHE 66. — Coupes de la jambe.

FIG. 1. — Coupe transversale au lieu d'élection.

FIG. 2. — Coupe transversale au milieu de la jambe.

FIG. 3. — Coupe transversale au tiers inférieur de la jambe.

PLANCHE 67. — Région interne du cou-de-pied.

FIG. 1. — 1^{er} plan; médecine opératoire.

FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 68. — Régions interne et externe du cou-de-pied.

FIG. 1. — Région interne; 3^e plan.

FIG. 2. — Région externe; 1^{er} plan; médecine opératoire.

PLANCHE 69. — Région externe du cou-de-pied.

FIG. 1. — 2^e plan.

FIG. 2. — 3^e plan.

PLANCHE 70. — Région dorsale du pied.

FIG. 1. — 1^{er} plan; médecine opératoire.

FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 71. — Région dorsale du pied.

FIG. 1. — 3^e plan.

FIG. 2. — 4^e plan.

PLANCHE 72. — Région dorsale du pied.

FIG. 1. — 5^e plan.

FIG. 2. — 6^e plan.

PLANCHE 73. — Région plantaire.

FIG. 1. — 1^{er} plan; médecine opératoire.

FIG. 2. — 2^e plan.

PLANCHE 74. — Région plantaire.

FIG. 1. — 3^e plan.

FIG. 2. — 4^e plan.

PLANCHE 75. — Région plantaire.

FIG. 1. — 5^e plan.

FIG. 2. — 6^e plan.

PLANCHE 76. — Coupes du pied.

FIG. 1. — Coupe horizontale passant par le milieu de la malléole interne.

FIG. 2. — Coupe transversale au niveau de la tête de l'astragale.

FIG. 3. — Coupe transversale menée du premier cunéiforme à l'extrémité postérieure du cinquième métatarsien.

FIG. 4. — Coupe transversale au milieu du métatarse.

